

醫

碕

醫編卷之三

南海何夢瑤

雜症

○腫脹

腫脹有二。一因於水。水氣停蓄于肌膚。或藏府。因而肌膚或腫。

其色鮮明潤澤。其皮光薄。其肉脆。其身重。

其腫不連。每自下而上。腫有分界。按其手足上。如糟如泥。成窟。

不起。按而散之。猝不能聚也。肢體如弓。腰未轉。一因於氣。氣熱。

壅滯作脹。所謂諸腹脹大。或氣寒不運作脹。所謂胃寒則頭脹。

或氣實作脹。實者邪氣實也。如氣因痰食。血七情。壅滯而虛。

壅盛作脹。所謂脾氣實則腹脹。胃氣實則脹也。

氣虛作脹

虛則不能運所謂氣虛中滿太陰虛則鼓脹也

其色蒼老皮厚肉堅其脹或

連胸脇或倏然而脹者陽性急速也或自上及下者陽本乎上

也或通身盡脹者氣無不至也以手按之隨手即起者如按氣

囊也

兩足或有按之不能猝起者氣蒸成水氣親上水就下故也

証既不同施治亦異然水

與氣本一物

觀噫氣成水熱病常相兼水苗氣必滯水成氣可知矣

氣雖水亦停則治水當

兼理氣

氣行水行水治氣當兼行水亦通

治水當分陰陽陰水無火之也或益脾肺之陽水或補命門之

火陽水有火之水也隨火之所在而治之

少年內畜最多此証

遍身腫煩渴小便赤澀大便多閉此屬陽水輕宜四磨飲氣添

磨生枳壳兼進保和丸

見信飲食重則疏鑿飲子利之以通為度

雖煩渴而大便已利者宜用五苓加木
通大腹皮以利小便。五苓見傷濕△

偏身腫不煩渴大便自調或溏泄小便雖少而不赤澀此屬陰

水宜實脾飲小便如常至晚有微赤却無澀滯亦屬陰也不可

遽補木香流氣飲。見繼進復元丹若便不溏氣息磨飲下黑丹

逆見呃

陰水雖宜補陽然小火不能勝大水必先瀉去其水乃用煖藥

以補元氣。陰水雖寒久亦變而成熱寒本也熱標耳。

金匱分五水曰風水皮水正水石水黃汗

風水脈浮骨節疼痛

水在流

或重而酸

水在肌

發熱無汗惡風外感

邪風

面目腫大目下微腫如蚕如新臥起狀

目下屬太陰又胃細筋散目下土虛則水

反尅循胃脈頸脈動人迎脈也水浮水浮時時欬木氣當發汗脈

浮而洪浮則為風洪則為氣氣熱也風氣相搏風多于則為

癰疹身體為痒痒為泄風言痒者名為泄風也熱為風久為痴

癰即痛癰以風熱久不散持而為濕氣強則為水熱多而不得

成水難以俯仰水浸淫于肌風氣相擊身體浮腫汗出乃愈此

為風水此句上有惡風則虛句下有惡風者小便通利上焦

水脈浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之固表以腹痛加芍

藥加芍藥甘草以調中風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大

熱越婢湯主之惡風汗出而惡風加附子

皮水皮受水濕也脈浮水在皮附子熱邪從下按之沒指不

惡風非邪也其腹如鼓如鼓則非鼓也以水有皮膚不在不渴

故不當發汗渴而不惡寒者此為皮水惡風寒上言皮水

不渴此言渴者蓋皮水亦有淺深之分深而皮水為病四支

腫水氣在皮膚中防已茯苓湯主之裏水當依金鑑越婢加

朮湯主之甘草麻黃湯亦主之

正水腎藏之水其腹如鼓脈沉遲喘水泛于

石水脈沉腹滿不喘陰盛結于少腹如石之下沉

黃汗汗出沾衣如黃柏汁濕土脈沉遲身發熱濕滯陽氣不行

胸滿四支頭面腫不愈必致癰膿濕熱久而愈盛氣血身腫

而冷狀如周痺胸中塞不能食也濕痹反聚痛熱為寒濕所鬱相

也。暮躁不得眠。

暮則寒。湯愈盛。熱故躁不得眠。

此為黃汗。

黃汗身體腫發。

熱汗出而渴。狀如風水。

皆面目浮腫也。

脈自沉。以汗出入水中。浴水從

汗孔入。得之。

汗然汗出。浴水亦舉。隅之論。耳皆推廣之。黃耆芍

藥。桂枝。苦酒。湯主之。

方無清熱去濕之品。徒取固斂得

無藥乎。此方恐是錯簡。終不可用。

金鑑謂桂枝散邪。黃耆固衛。白芍酒酒

按風水皮水皆水之在表者。以感風受濕為別。故有惡風與不

惡風之分。正水石水皆水之在裏者。以上浮下沉為別。故有喘

與不喘之異。黃汗雖狀如風水。而風水脈不沉。汗不黃。自不同

也。黃汗當泰黃疸門又按正水。水之上浮者。必干肺。故喘。然肺自有

水病。故金匱謂痛在骨節。欬而喘。不渴者。此為肺脹。本文作脾

脹。今從金

其狀如腫。似腫非腫。蓋肺脹發汗則愈。越脾如又謂肺水
其身腫。皮膚浮腫。小便難。通調水道。下輪芽。炆時時鵝瘡。水囊相雜
腸水是也。又按石水。水之下沉者。即金匱所謂腎水者。腹大
臃腫腰痛。不得溺陰腫。陰腫舊在心水下。陰下濕如牛鼻上汗
其足逆冷面反癭。言不若他水之是也。又金匱謂肝水者。其
腹大不能自轉側。脇下腹痛。時時津液微生。小便續通。水氣上
逆液有時生。小便有時通。蓋肝喜心水者。身重少氣。即短不得
津冲逆土跡泄氣得上下時通也。心水者。身重少氣。即短不得
臥煩而躁。脾水者。腹大四肢苦重。津液不生。脾濕穀氣不運不
但少氣則小便難。氣弱不化。是各藏皆有水也。水在肝部則名肝
之。

外水腰以下腫當利小便。宜用貼臍等法。巴豆去油四錢水銀

綿一片布臍上內餚外用帛縛時許瀉下惡水三五次去藥白

粥補作弱者隔日取一次一餅可救三五人。法鮮赤肉陸根

搗貼帛縛定水自小便出一法田螺四個大蒜五個車前子末

三錢研成餅貼定帛縛少時尿利則愈。或內服沉香琥珀丸即

苦亭歷子郁李仁防已沉香陳皮琥珀腰以上腫當發汗。越婢湯

加杏仁蘇子赤茯苓澤瀉麝香也。以上腫當發汗。加蒼朮

喘急不得臥者。蘇子亭歷等分棗肉丸。四支腫宜五皮飲。五

飲不論陰陽水俱可先用。或除濕湯加木瓜腹皮。感濕者腰

如未効四磨飲兼吞桂黃丸。仍用赤小豆粥佐之。以下腫尤甚。五苓散。見傷

吞木瓜丸。見中。問進除濕湯。見中。加

木瓜腹皮萊菔子。炒。惟面與足腫。早則面甚。晚則足甚者。風

水也。風上行則面腫。濕氣非風。視大便之硬澀。別其証之陰

陽除濕湯。見中。加木瓜腹皮白芷可通用。或以蘇子降氣湯。見

陽除濕湯。見中。加木瓜腹皮白芷可通用。或以蘇子降氣湯。見

陽除濕湯。見中。加木瓜腹皮白芷可通用。或以蘇子降氣湯。見

陽除濕湯。見中。加木瓜腹皮白芷可通用。或以蘇子降氣湯。見

除濕湯各半貼煎服。單面腫則用蘇子降氣湯。足腫則用除濕湯。內水腹大小。

便不利。脈沉甚。可下之。之十棗湯。濟川散。神祐丸。禹攻散。舟車丸。之類。蓋水可從小便利。亦可從大便泄。

也。病輕者枳實白朮湯。白朮補土。枳實破堅。張元素治痞變此湯為丸。以彼屬食積所傷。故用片以消。

磨之。此水飲所作。故用湯以湯滌之。水脹冬瓜宜長吃。鯉魚重一觔已上者煮

取汁和冬瓜葱白作羹食之。青頭鴨或白鴨去腸雜細切和米

煮粥空腹食之。老鴨者佳殺取血俟凝銀簪劃片燒酒熱泡食

之鴨身去毛雜燒酒頓爛空心食俱不着鹽服後小便利腫立

消。忌鹽三年。水腫外散內利峻劑疏鑿飲子和劑茯苓導水

湯。醫貴胃虛不能制水者以補土為主。補中益氣湯六君子

湯等。二方並見氣實脾飲亦可。脾氣旺則水自行不必加行氣利水之品。若

腎火虛。三焦之氣化不行。關門不利。水聚不出。惟濟生腎氣丸

見虛最驗。若腎水虛火炎。水從火溢。上積于肺。喘不能臥。腹大

勝腫腰痛。兩足先腫。小水短澀。面赤或腫。口渴大便反燥。六味

見虛加麥冬五味牛膝車前。已上論水腫

氣脹又名鼓脹。以其外雖堅滿。中空無物。止氣作脹耳有似乎鼓也。

若兼中實有物。食痰蠱血之類盤踞藏府。如木之藏蠹。如皿之聚蟲。則

又名蠱脹。又有中毒而腹脹者曰蠱毒鼓脈必浮革。蠱脈必牢實。治蠱如大

黃芪硝牽牛檳榔三稜蓬朮俱可用。一味地栗乾最妙。氣實

作脹。宜厚朴等以破滯。氣虛中滿。宜補氣。加芍藥等以收其散

渙。更分寒熱。虛而寒者。寒脹中滿。分消湯。虛而熱者。熱脹中滿。

分消丸。七情脹五膈寬中散。見反木香流氣飲。沉香降氣湯。

並見大怒而脹分心氣飲。憂思過度而脹紫蘇子湯。大

病後浮腫白木三錢。參芪各一錢半。白茯苓二錢。陳皮半。麥麴白

芍木香各一錢。炙草大腹皮各五分。薑棗煎。久瀉後脹者。六君

子。見加白薤白梗。常服。服后脹益甚。勿疑久自效。因無而成

水腫。分氣香蘇飲。老人虛寒脹。厚朴炮附木香。因飲食所傷

者。氣必滯。胸膈悶。消導寬中湯。失飢傷飽痞悶停酸。早食

暮不飽。胃弱難化也。大異香散。畜血作脹。腹皮

上見青筋。脈壯滿。婦人多有此。先以桃仁承氣湯。勢重者抵

當湯下之。或代抵當丸。並見虛人不可下者。且以禹歸活血散

調治。血脹多有煩燥。漱水不嚥。迷忘如狂。痛悶喘急。大便黑。

小便利。虛汗。熱氣為血。虛汗。熱氣成。虛汗。逆等証。人參歸芎湯。痰能滯氣。勿。

謂不能往。脹。故古人治氣為癥。鬱作脹。加味枳朮湯。氣水血。

三者病常相因。有先病氣滯而後血結者。如婦人先病氣滯。後

有病血結而後氣滯者。如婦人先病月經不。有先病水腫而血

隨敗者。水積日久。透經絡。有先病血結而水隨畜者。血結則

熱蒸少水。婦人月經不利。化水腫。須求其本而治之。積聚相

攻。疼脹。初用七氣消聚散。日久弱者。參朮健脾湯。少佐消導藥。

蟲聚作脹。治法詳蟲門。已上論氣脹。食血痰蟲積聚。雖非

氣為土。故皆屬之氣也。

藏府外。胸腹中邪充塞。則胸腹脹矣。經絡營衛氣無不到。則血

脈皮膚無不脹矣。

故有脈脹膚脹之名。脈脹者筋起絡色變。而木香流氣飲治膚脹。加撫芎藭黃治脈脹。

欲知爲何部之邪。則先脹處與脹甚處是也。

脾胃受邪則先從脾胃者。則飲食少。屬他藏府者。則飲食如常。又脹在皮膚。經脈者。飲食亦如常。在腸胃間者。則飲食少。皆宜細察。

更須分虛實。其藏府之氣本盛。被邪壅塞不行者爲實。氣本不足。因

邪所壅者爲虛。

虛中亦有塊竇。以其邪爲實者驅之。虛者補之。食痰血濕等有形之物也。

寒者熱之。熱者寒之。結者散之。留者行之。邪從外入內而盛于

中者。先治其外而後調其中。陰從下逆上而盛于中者。先抑之

而調其中。陽從上降而盛于中者。先舉之而調其中。手足不

腫。獨腹脹。謂之單腹脹。俗名蜘蛛蠱難治。

以病全聚于藏府。不分散于四支也。實者

厚朴散虛者
謂中健脾丸

服藥後手足腫病自內達外也。不久愈。若從手

足至腹。為從外入內難治。

以病全聚于臟腑。不分散于四支也。黃者厚朴散。虛者謂中健脾丸。

服藥後手足腫病自內達外也。不久愈。若從手足腫至腹。為從

外入內難治。

男自下而上。

男陽盛邪不易犯。今乃以女自上

而下。

女陰盛邪不易侵。今亦以男止下腫。女止上腫。皆

難治。不足慮。不在難治之例。

譬如草寇竊發。原易撲滅。若直逼京師重地。乃可危耳。

子和治一婦水腫。四支不舉。令以草貯布囊。高支兩足而臥。乃

服上涌下泄瀉之藥。自腰以上水覺下行。自足跗以上水覺上

行。會於臍下。泄瀉而出。病大減。此法宜知勝於升提也。

診法 內水脈沉。

外水脈浮。

氣脹浮沉無定。

氣時外行時內聚故也。

總以有神和緩有力也為佳。忌弦細微弱。

水腫鼓脹死証。腹脹身熱陽盛也而失血則陰亡。四末清也。脫也。

陰盛瀉數行中亦脫矣。腫先四肢後入腹利旋腫滿而旋消旋脹。

腹筋青青脈起。唇黑傷肝。臍突傷脾。陰囊腐傷腎。缺盆脊背足心平缺盆。

傷背平肺傷足平腎傷。掌腫無紋心脈虛瀉。血氣敗。腫脹逢之總可驚。

○黃疸

病由濕熱蒸發如掃麵相似。徧身頭目爪甲皆黃。小便黃赤不

利有色如黃者。有外感鬱熱與素有之濕相蒸。或外感于濕與素有

之熱相蒸而發黃者。宜從汗解。詳傷寒論。有内生之濕熱相蒸

者。在上則吐之。在下則下之。利之。然有陽黃陰黃之分。蓋熱勝

則為陽黃濕勝而寒則為陰黃不可概用寒藥 內因有出于

停食者仲景所謂穀疸寒熱不食

言其人先有寒熱之病食即則胃不和故不能食也

食即

頭眩

強食不化濁氣上升使然

心胸不安久之發黃

食鬱成熱蒸濕而發

茵陳蒿湯主

之又謂穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通

濕熱

身體盡

黃是也

內經謂已食而飢者胃疸乃熱盛濕少故能消穀乃胃熱非食滯也與此不同

此陽黃也又謂

陽明病脈遲

胃寒

食難用飽飽則發煩

飽則不消而煩

頭眩小便難此欲

作穀疸

始雖寒久亦成鬱熱

雖下之腹滿如故以脈遲故也

詳傷寒論陽明篇中

此

陰黃也

有因於酒者酒性熱而質濕濕熱內瘀多發黃仲景

所謂鼻燥心中熱脈浮欲吐者吐之愈

病屬上焦

又謂心中懊惱或

熱痛不能食梔子大黃湯主之

病在中焦

又謂或無熱

無外熱也觀或字知有外

癰疽者 謔言小腹滿脈沉者下之 病在下焦 又謂酒疸下之久久為黑

疸 病在上焦者應吐若誤下則傷其血分故血敗而見黑色 目青面黑 舉面目以心中如噉

蒜蘖狀 辛味刺心 大便黑 瘀血之色 皮膚爪之不仁 血痺干是也 有由

干房勞者致腎水虛相火炎不特蒸濕成黃併瘀血變黑仲景

所謂黃家日晡發熱 濕屬脾土故而反惡寒 傷寒陽明証發熱者必不惡寒乃濕

與熱瘀痺於內表陽不宣故惡寒也此乃辨証之法 此為女勞得之膀胱急少腹滿身盡

黃額上黑 額最高火氣之所薰故黑 足下熱因作黑疸 先則額黑後其腹脹

如水狀大便秘黑時塘此女勞病非水也復滿者難治 脾腎皆

難治消石礬石散主之 消石鹹寒除熱礬石除痼熱在骨髓又謂

額上黑微汗出 濕欲外泄 手足中熱薄暮即發 陰熱故 膀胱急 血瘀

諸痛 卷之三黃疸

小便自利可知膀胱之曰女勞疸是也 其餘所因尙多而古

人止分穀疸酒疸女勞疸及總名之黃疸與五水中之黃汗詳水

脈爲五然不必泥當推廣之 仲景謂疸而渴者難治熱不渴

易治發于陰部其人必嘔陰者裏也裏氣逆故嘔發於陽部表其人振寒

而熱濕勝則寒又調腹滿舌痿也或曰舌當作身濕熱傷筋故

瘕躁不得睡又謂諸黃但利其小便茵陳五苓散主之脈浮當

汗解桂枝加黃芪湯主之此方不可輕用又謂壯熱熱在裏當下之又

謂腹滿小便不利而赤自汗出爲表和裏實當下之大黃消石

丸此皆言陽黃也又謂小便色不變欲自利腹滿而喘此爲寒

上浮熱不可除熱除熱必嘔乾嘔也虛陽爲寒小半夏湯主之散

降此言陰黃也陰黃小便清白大便不實喜靜能臥脈遲弱無

力身冷自汗常以虛寒治之仲景所謂男子黃小便自利與小

建中湯見勞王海藏謂中州寒生黃用大小建中見勞不必因

陳皆氣虛之陰黃也氣虛則脾不運久疾于裏則脾敗而色外見故黃其黃色必淡戴復菴謂

失血後多面黃或徧身黃但不及血不榮也如竹木春夏葉潤

則緣至秋則乾黃宜養榮湯見虛十全大補湯見虛妨食者四

君子見加黃芪扁豆此血虛之陰黃也此為乾黃小便利已

上証準繩謂是暴病言其黃驟故仲景以十八日為

期仲景謂治之十日已上差反虛者難治十八日乃脾水當旺

愈也然另有一種病黃者其黃以漸見名食勞瘵黃或由食積

可不泥久而不愈者黃疸十

或出疳積所致或大小溫中丸聚礬丸煖中丸右前三方以針
名黃胖脾者腫也

砂醋之類伐肝以朮米之類助脾後一方以礬醋之酸瀉肝

蒸而發胖如餒頭蒸而起發礬醋以聚肉之甘補脾虛人佐以
收斂使之瘦縮凡收斂即屬伐肝

補劑按此即今人所謂黃腫與黃疸分別處在腫而色帶白眼

因如故不如黃疸之眼目皆黃濕盛則但黃而不亮熱盛則鮮明如橘干乾黃則枯槁不潤蓋

色潤者屬水色光者屬火若色如烟薰黃黑晦滯枯槁無光為
危証舊說濕勝如薰黃黑晦存參按黑晦即不亮也然未必

枯若併不潤則是癰而不帶白且無腫狀似不必以暴漸分又
敗之死水難治矣

黃腫多有蟲與食積有蟲必吐黃水毛髮皆直或好食生米茶

葉之類用使君子檳榔川練雷丸之類食積則用消食藥劑中

不可無針砂消積平肝其功最速治法亦與黃疸有別也 又

有瘧疫發黃詳瘧疫門

又有瘀血發黃身熱小便利大便黑

脈澀桃仁承氣湯

見血下

盡黑物愈

又有身不黃獨目黃者經

云風氣自陽明入胃循脈而上至目眦其人肥風氣不得外泄

則爲熱中而目黃青龍散主之

按此亦舉隅之論耳

治法升溪謂五疸不必細分概以濕熱治之

養胃化疸湯茵

陳蒼朮木通澤瀉猪苓山梔白茯苓薏苡仁食滯加神麴山查

麥芽酒疸加苜蓿葛根女勞疸加當歸紅花活血 有神驗方

黃蠟香油攤膏長六寸筋頭捲濕麪二指厚大如掌中以指穿

二孔對臍貼將膏捨入孔燃火薰最久者九條立愈

穀疸紅

丸二

見傷飲食

寶鑑因陳梔子湯穀疸九 酒疸梔子大黃湯葛根

煎湯或梔子仁煎湯調五苓散見傷濕或生料五苓散加乾葛一

錢或葛花解酲湯見傷飲食酒疸變成腹脹漸至面目周身俱腫

霍脾飲加木香麥芽各五分女勞疸加味四君子湯大便不利者宜

滑石散利者宜腎疸湯病後脾氣虛而黃者吳功散見氣加薑

芪扁豆各一錢黑疸多危急用土瓜根一觔搗碎絞汁六合

頓服當有黃水從小便出再服之目黃不除瓜蒂散見傷飲食

鼻取黃水

消渴此為局而且消之証其尋常止患渴者附後

河間謂山水虛火炎燥熱之甚故渴而飲水多干和亦謂心火

太盛津液耗涸在上則為膈消甚則消及肺藏在中則為腸胃

之消甚則消及脾藏在下則爲膏液之消甚則消及腎藏在外則爲肌肉之消甚則消及筋骨四藏皆消則心自焚而死矣治此者但調之而不下則小濡小潤固不能殺炎上之勢下之而不調亦終不能沃膈膜之乾下之調之而不減滋味戒嗜欲節喜怒亦病已而復作証分上中下皆從火斷之

上消者大渴飲多甚者舌亦赤裂經謂心移熱於肺傳爲膈消

者是也二便如常知其燥在上焦白虎加人參湯見發熱主之小

便少者乃熱消燦其水也此消之一義也亦用前湯加生津滋燥之藥

如花粉北味麥冬乾葛之屬若小便不利者不利非少也蓋有水利而不利耳前

湯合五苓散見傷濕子和調惡變爲水腫者是也若小便利者

所謂飲多溲亦多也

詳見下文

前湯加辛潤之品以開通腠理可也

上消大概心火盛黃連一味煎湯候冷遇渴頻飲久而自愈

若用心過度致此者黃芪六一湯加蓮肉遠志各一錢吞玄兎

丹仍以大麥煎湯間下靈砂丸 糯穀炒燥桑根白皮等分每

服一兩水煎渴即飲之使水穀之氣上蒸于肺化為津液此金

生水之義二物皆肺藥又淡滲故取之 縹絲湯能引清氣上

朝于口又蠶與馬同屬午火心也作繭成蛹退藏之義故能抑

心火而止渴也 治上者劑宜小而服宜頻京垣謂消渴未傳

能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹蓋能食者為

實火火盛則血壅于經絡故生疽瘡

病甚而不潰或潰出赤水

不能食者為

虛寒虛寒則氣不運故脹滿而所以致虛寒者何曰以寒治熱固如繩墨之不能廢然藏府有遠近心肺位近宜制小其服肝腎位遠宜制大其服使之適至病所而止否則或過或不及皆為誅罰無過如上消而制大則速過病所而寒其中下焦因致脹滿之病所謂上熱未除中寒復起也是以處方宜審故曰心肺之藥莫厭頻而少

中消者善食而瘦

熱能消穀也此消之一義也瘦熱灼肌肉消削也此消之又一義也

渴自汗大

便硬小便頻數黃赤是胃熱盛叔如所謂口乾飲水多食飢虛

成消中者是也

子和釋經二陽之病發心脾男子少精女子不月其傳為風消謂二陽乃胃與大腸病熱心受

之則血不流故女子不月脾受之則味不化調胃承氣湯見大便男子少精風火消涸腸胃此腸胃之消也

通

或三黃九

見發熱

生地白蓮藉各自然汁牛乳各一觔熬膏和

黃連末一觔九如桐子大白湯下三五十丸日十服 黃連猪

肚九

清涼飲子

見傷燥

下消者煩渴引飲小便如膏面色黧黑耳輪焦枯兩腿消瘦此

腎熱也又名腎消六味地黃九

見虛損

主之多因色慾過度服金

石藥腎水涸竭虛陽上炎不交精出小便淋濁陽道常堅古謂之強中也

按三消在河間子和以爲熱証而金匱謂消渴小便反多飲一斗溲一斗腎氣九主之又內經謂心移熱于肺爲肺消飲一溲二者死不治是三消固有寒証乎曰此雖亦名消渴而實不當

以消渴名者也蓋金匱所言乃因其人命門火衰不能蒸動腎

水與脾胃中穀氣以上達于肺故上焦失潤而渴其所飲之水

未經火化直下膀胱故飲一溲一其味不鹹腎氣丸即八用附

桂以壯其命門之火如釜底加薪則水穀之氣上騰蒸爲潤澤

也然此証止因水不上滋而渴非如盛火之焚灼則其渴不甚

飲亦必不多其謂飲一斗溲一斗者乃令其與熱証之大渴引

飲不止者安得無殊哉且腎熱則小便如膏腎寒則小便清白

又自有辨也至若內經所言心火衰微反爲水冷金寒之化不

特所飲之水無氣以化且併身中之津液亦無氣提攝相併下

趨而成飲一溲二之証則肺氣之消索已甚尚何大渴大飲之

有此皆不當名消渴致後人涇渭不分動手卽從溫補熱証逢之不死何待此河間子和二公所爲大聲疾呼而痛詆其非也

河間謂飲多而小便多者非虛寒無火不能制水乃燥熱太

甚腸胃三焦之腠理怫鬱結滯緻密壅塞水液不能滲泄于外

如水沃石

過而不留故洩多也

此消之又

當除其燥熱濟津液之衰使道

路散而不結氣血利而不澁

卽前所謂以辛潤之品開通腠理也

又謂常有陽極

似陰者下部覺冷兩足如冰乃心火不降宜寒藥下之三五焦

則火降水升寒化自退其言可謂名通 子和謂心爲陽火先

受寒邪火鬱傷肺火與寒皆來乘肺肺外爲寒所薄陽氣不得

泄內爲火所燥故皮膚消索洩溺與積濕頻併飲一洩二膈消

不爲寒所薄陽得宣散故可治肺消爲寒所薄陽氣自潰于中故不治亦一說也

三消通治好黃連治淨爲末冬瓜自然汁和成餅陰乾再爲末再和如是者七次仍用冬瓜汁丸桐子大每服三十丸太麥仁湯入冬瓜汁送下尋常渴一服效小便既多大便便秘宜常服四物湯見調之糯米泔折二亦可冷進三消久而小便不其反作甜氣在溺桶中涌沸其病爲重更有如豬脂浮在溺面如柏燭淚濺在桶邊此精竭也難治水在天地與人身皆有甘有鹹甘者生氣鹹者死氣小便死水也本鹹而反甘是生氣泄也脾胃之生氣下陷矣蒸汗門脫汗味淡更明三消久之精血虧或

目無所見或手足偏廢如中風須滋生精血 愈後須防發癰

疽黃芪六一湯下忍冬丸 末傳鼓脹水氣五皮飲見腫送濟

生腎氣丸

見虛損

東垣中滿分消諸方

見腫脹

可選用

坎乾水也

氣也小而井大而江河也兌坤水也形也微而露大而雨也一陽陷于二陰之中爲坎坎以氣潛行萬物之中爲受命之根本故潤萬物莫如水一陰徹于二陽之上爲兌兌以形普施千萬物之上爲資生之利澤故說萬物莫說于兌三焦爲無形之火制以有形之水者兌澤也可暫光也吾身自有上池真水氣也天一所生也以無形之水沃無形之火常而可久者也是爲真水火升降既濟湯自止矣

尋常消渴飲食勞倦氣虛發熱致津液不足而渴不可與五苓

見傷

宜補中益氣湯

見氣加五味子葛根

無病自渴與瘥後渴

參朮飲四君子湯

見氣縮脾飲暑

俱加乾葛

久病陰虛黃芪

飲四物湯

見血加人參木瓜或七珍散去朮加木瓜

產婦血虛

渴宜益血

酒渴乾葛飲調五苓散

多食果子致渴藥中加

麝香

停飲致渴詐痰飲門

○痿

發於夏者俗名注夏

痿者手足軟弱無力縱緩不收也

卽俗所謂手攤脚軟之意

蓋熱而兼濕使

然觀物之寒而乾者必堅硬收引熱而濕者必柔軟弛長可見

濕屬土胃爲水穀之海主潤筋脉胃病則不能運行水穀濕停

筋脉中不爲潤而爲澇與熱相合故治痿獨取陽明也五藏皆有熱熱者火也火屬心而傷肺又制火者水金爲水之源源傷則流絕重其源之傷故總歸于肺熱也然此証之有熱無寒則然矣其有濕與否則須細辨若無濕而概用燥藥以利水則火益燥烈筋脉反致枯乾攣縮求爲弛長緩縱而不可得矣治者審之無濕亦有痿者以津液爲熱所灼尚未即乾雖不弛長亦未短縮但因弱柔軟而不能行動也觀草木遇烈日而枝葉萎軟內經分五痿肺熱葉焦皮毛虛弱急薄著皮乾緊與肉相薄而可見矣着于肉也而生痿躄足不其証色白而毛敗心熱則下脉厥而上三在下之脉因上則下脉虛虛則脉痿樞折挈膝腕似折而脛縱心熱而逆上則下脉虛虛則脉痿樞折挈不能提挈也脛縱而不任地其証色赤而絡脉溢肝熱則胆泄口苦筋膜乾筋膜

乾則筋

其証色蒼而爪 熱則胃乾而

肉痿其証色黃而肉蠕動腎熱則腰脊

為骨痿其証色黑而齒槁又論其致

亡失所求不得則發肺鳴

咳嗽也

肺熱葉焦五藏因

熱葉焦發

為痿躄悲哀太甚則胞脉絕

則陽氣內

心下崩數溲血大

經空虛發為肌痺傳

脉痿思想無窮所願不得意淫于外八

房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫筋痿者生于肝使內有

漸于濕

漸漬也

以水為事

如舟居者習於水

居處相濕肌肉濡漬痺而不

仁發為肉痿得之濕地有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣

內伐內伐則熱舍于腎水不勝火骨枯髓虛故足不任身發為

骨痿細詳經意是言五藏各有自致之痿有他病傳變之痿

痺傳為脈痿句可知

而總歸於肺熱所發也至其致熱之由或言七情或

言房色或言傷濕或言勞倦乃互文以見內外諸邪皆足生病

未見有歸重於濕之意但本証論治謂陽明為藏府之海主潤

宗筋束骨而利機關與衝脈

衝脈又名血海

合於宗筋屬於帶脈陽明

虛衝脈無所

則宗筋縱帶脈不收

所謂虛則不能行濕不為潤

可故足痿而不用所以治痿獨取陽明又生氣

論于濕熱

攘大筋繆短小

繆短為拘弛長為

此証固以濕熱言不以熱言也故古人方中多

个蒼

澤瀉及諸風藥但此証屬乾熱者畢竟多然則滋陽明水穀之

氣以潤宗筋 北方少陰之精以沃潤澤尚憂無濟反欲利其

濕哉 治法熱者補陰丸 東垣取黃柏為君以滋水清熱尚

崖謂風藥及香燥溫補之劑斷不可用童便一味最妙清燥湯

詳傷暑用黃連黃柏麥冬五味生地當歸以清金滋水養血入參

黃芪甘草以補肺氣有濕用二朮二苓澤瀉濕在下部者加升

柴升提以利之飲食少進用陳皮神麴 肺熱宜黃芪二冬右解腎

哈山藥犀角桔梗枯苓梔子杏仁之屬有濕加水通秦艽 必

熱黃連苦參牛黃龍齒牡丹皮地骨皮犀角 肝熱生地天冬

白芍柴胡龍胆草白茯苓黃芩黃連以脾熱痰濕二朮三陳霞

天膏等甚則三化湯見中調胃承氣湯見大便不通下之控涎丹見痰

取之

腎熱六味

見虛損

加知柏

濕熱健步

尤加黃

芩或小胃丹

見痰飲

攻之

濕痰二陳加

薑汁

血虛四物

見血加減

氣虛

壯水食氣

蒼朮黃柏

死

血桃仁紅花歸尾赤芍

謂恐懼

不解則傷精

傷腎亦多端矣舉恐精傷則骨痠痿厥精時自下

腎傷精脫則水淫可知水

虛則火炎熱而筋弛可知

又謂三陽

即旁光太陽經

為病發寒熱下為

癰腫

熱勝可知

及為痿厥是也又屬脾濕經云凡治痿厥肥貴人

言

富貴

則膏粱之疾也

濃酒厚味積為濕熱

又云秋傷于濕

秋為燥令而云傷濕者以見秋

亦有傷濕

發為痿厥是也

東垣治粘合公三十二歲病此尻

陰皆冷陰汗燥臭精滑不固此醇酒厚味滋火半內逼陰于外
醫誤作寒治十旬不愈脈沉數有力以滋腎大苦寒之劑制之
以急寒因熱用再服而愈當是滋腎丸神左經丸續骨丹治
濕痰汚血阻礙經絡而致者 兼表邪越婢加朮湯見補

○肺痿肺癰

金匱問曰熱在上焦者因咳為肺痿火刑金因咳壯火食氣故

用曰肺痿何從得之師曰或從汗出言汗出過多也或從嘔吐或從消

渴小便利數或從便難血已燥矣又被快藥下利重亡津液已上數

津液之由故得之津液傷則熱甚矣曰寸口脈數其人刻口中反

有濁唾涎沫者何津液既傷則熱為乾熱何師曰此為肺痿之

病肺熱則清肅之令不行水精不四布留貯胸中化為涎沫不但清他藏併肺亦不滋乾者自乾唾者自唾也若口

中辟辟燥咳即胸中隱隱痛脈反滑數此為肺癰肺癰分故津液隨

氣分化為涎而出諸口然亦有唾濁者觀下文便知滑反滑涎之診既

而不出諸口然亦有唾濁者觀下文便知滑反滑涎之診既乾燥無痰涎則脈應滑何以反滑以欬唾膿血從咳唾出脈

血熱也然初雖數滑後則數實矣數實者為肺癰氣壅血問

數虛者為肺痿津液亡則陰虛數實者為肺癰金鑑云微當

曰病咳逆何以知此為肺癰曰寸口部言脈微作浮不同而

數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒此以外感言故脈

惡風中于衛熱過于營過入也外感風寒內呼氣不入熱過于

營句止吸而不出利也即下喘滿意風傷皮毛熱傷血脈風

舍於肺由皮毛其人則咳大則金肺口乾喘滿咽燥不渴熱

未遠傷其津液故時唾濁沫即傷風時振寒即惡寒熱之所

過血為凝滯時時振寒則表久不解而熱不散于是日漸深入而血凝滯畜結癰膿吐如米

粥實後吐膿始萌可救膿成則死亦有不死者觀下文便知此條舉外感而言而內傷之

致此者可例矣咳而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭肺癰

亦有唾涎沫者矣由此推之則肺痿亦必有不吐涎沫者矣必

以乾熱為主即有涎沫亦吐者自吐乾者自乾況無涎沫可吐

者其為乾澀又何待言乎合瘵門詳看其理自見矣熱得濕而

后壅腫成癰則肺癰多為濕熱故時吐濁其不久之吐膿如米

粥者為肺癰桔梗湯主之以解毒排膿上條言死此條言不死蓋証有輕重之別也肺癰

喘不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之大苦大寒峻瀉肺邪恐稍遲延膿成則死也肺

癰胸滿脹一身面目浮腫濁氣不得下降之故鼻塞清涕出熱氣上蒸不

聞香臭酸辛

肺熱攻鼻故酸辛濁氣充塞故不聞香臭

欬逆上氣喘鳴迫塞葶藶大

棗瀉肺湯主之

肺痿吐涎沫而不欬者

肺痿咳而吐涎沫本証也今止吐涎沫而

不咳則似肺痿而實非肺痿矣

其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不

能制下故也此為肺中冷

肺冷則氣寒不能攝津液故上則吐沫下則小便不禁也

必眩

經

上虛則眩是也

多唾涎甘草乾薑湯以溫之若服湯已渴者屬消渴

小便

多而渴者為消渴小便多而不渴者為肺冷然消渴病初起亦有不遠渴者誤作肺冷治之遂現渴症此仲景教人辨別肺痿

肺冷消渴之法

喻嘉言曰纔見久咳先須防此兩証肺癰由五臟蘊崇之火與

胃中停蓄之熱上乘乎肺肺受薰灼血為之凝痰為之裹遂成

小癰日漸長大則肺日脹而脇骨日昂乃至咳聲頻併痰濁如

膠憎寒發熱日晡尤甚面紅鼻燥胸中甲錯甲錯謂枯索粗結如鱗甲相錯也

始先苟能辨其脈証屬表屬裏極力開提攻下無不愈者迨至

血化爲膿肺葉朽爛傾囊吐出十死不故嗟無及矣又去金匱

治法貴得其大要多方圖之生胃津潤肺燥下逆氣開積痰止

濁唾補真氣以通肺之小管散火熱以復肺之清肅亦能復起

可不致力乎 尊生肺痿舉肺湯桔梗甘草竹茹二冬阿膠沙

參百合貝母 肺癰手掌皮粗氣急顴紅脈數鼻煽不能飲食

不治 肺癰清金飲刺熨藜苡仁橘葉黃芩花粉牛旁貝母桑

皮桔梗 咳吐稠痰胸脹喘急發熱玄參清肺飲玄參柴胡陳

皮桔梗茯苓地骨麥冬苡仁甘草檳榔煎成入童便一盞服

重者不能臥寧肺桔梗湯桔梗貝母當歸瓜蒌仁黃芪枳壳甘草節桑白防己百合苡仁五味甜葶藶地骨知母杏仁身熱加柴胡便秘加熟大黃勿論已成未成通用金鯉湯鯉魚一個重四兩去腸勿經水貝母錢未二人鯉腹內線縫重便一碗浸重湯煮至魚眼出為度去鱗骨淨肉仍浸童便內頓熱連便服之日三次効速已吐膿後排膿散黃芪白芷五味人參各等分

○痺麻木

內經謂風寒濕三氣雜至合而為痺痺閉滯也身中血氣風氣勝者為行痺風善行動噓其寒濕走注寒氣勝者為痛痺血氣痺滯無不痛者而寒之痛為甚以寒則凝其滯而不通比濕尤甚故痛若虎咬世呼為白虎風是也濕氣勝者為

著痺不如風勝者之流走但着而不移亦不如寒勝者之痛西
與緊然有異則氣血之行其為即滯冲擊者固有微甚之分也是名三痺皆

經又分以今得之為骨痺骨重不舉春得之為筋痺筋緩夏得

之為脈痺血脈不流長夏得之為肌痺肌肉不仁秋得之為皮

痺皮逢寒則急逢熱則是名五痺

又謂五痺久不愈重感于邪則名傳其藏如見胸滿煩喘欬嗽

是皮傳肺為肺痺也嘔吐痰涎心下痞硬四支懈惰是肌傳痺

為脾痺心煩心悸噤乾善噫厥氣上則恐如腎寒冲心則恐悸之類是脈傳

心為心痺多驚善怒脇脹多飲小便數是筋傳肝為肝痺善脹

尻以代踵足攣不伸也脊以代頭似雙不直也是骨傳腎為腎痺入五

藏則死矣

又謂傳府數飲而小便不通中氣喘急時為殭泄

不瀉則腹為腸痺

大小腸也

小腹膀胱按之痛若沃以湯瀝于

小便上為清涕為胞痺

胞即旁光

不言胆者缺文也

又有眾

痺周痺之名謂各在其處歇而復起在右相移更發更休名眾

痺若在血脈之中止隨脈以上下而不左右相移名周痺

周痺似中

風之偏廢然有痛而無口服藥針為異矣

按以上諸痺總皆風寒濕三氣為患特以

其受病之所在區別言之耳要其病本則一也

再按風即寒也

說見瘧論

雖曰風寒濕實寒濕二者足以盡之氣為

寒濕所閉氣盛而寒濕微者則走注而不甚痛若氣盛而寒濕

亦盛者則不甚流走而痛劇氣弱而寒濕甚者則着而不行亦

不甚痛或但麻木也經所謂風勝爲行痺者風有外風內風以

外風言卽寒之淺者止傷于衛行風勝猶云邪不甚閉遏故能流

走而不甚痛若以內風言則卽人身之氣矣是經言風卽兼言

氣可知也至寒之痛必由于氣盛冲擊濕之着必由于氣弱不

運固可推而得之耳 麻者非痛非癢如千萬小蟲亂行如麻

之亂也觀于脚麻可知木者不癢不痛併不麻頑然一物自己

肌肉如他人肌肉按之不知搔之不覺如木之無知也河間論

麻謂是氣滯東垣謂是氣虛蓋氣盛能行不麻至無氣不行亦

不麻惟氣衰不能運行流利停滯此處噓其津液痰涎紛亂沸

動所致也若血液凝滯者氣行不得滑利紛然而麻走其空隙亦麻或言風者誤也觀人之

久坐而起則脚麻及繩縛久釋之則亦麻豈非氣久不行得起
得釋而微通噓其久滯之血液而然哉李正臣夫人病麻晝減
而夜甚又閉目則甚開目則否蓋晝與開目則陽行於外氣得
流通故減也 再按外感之寒濕能痺豈内生之寒濕獨不痺
乎寒能滯氣滯血濕能停痰聚液觀之痰血痰飲之爲痺而初
無外感者可見矣不時此也内生之風亦爲痺內風者熱氣之
慄疾者也熱盛亦生濕生痰矣熱盛則血枯死血阻塞經隊則
亦不通而痺矣又忍尿亦成痺

尿不行則氣亦不行而乍痺必膝冷又飲臂麻木

一隔三反是在明者

治法

虛人痺者小續命湯見中風加減風勝倍防風寒勝倍附子濕勝

倍防已皮痺加黃耆或桂枝皮脈痺加羌黃或紅花肌痺加葛

根或白芷筋痺加羚羊角或續斷骨痺加虎骨或狗脊有汗減

麻黃便瀉減防已寒勝減黃芩加乾薑熱減附子加石膏

壯者增味五痺湯風痺以羌防為主寒痺麻黃附子為主濕痺

防已羌活為主皮脈等五痺加藥照前條三痺通用木通不

見水者二兩以長流水二碗煎一碗熱服取微汗昔有人夢得此方而痺痛

愈此謂通則不痛也不愈再三服視所勝照前方加味不得過三錢三痺湯

獨活寄生湯並治各痺久不已乘虛入藏五苓散見傷寒加附

子治胞痺加蒼木治腸痺氣虛麻木黃耆益氣湯冷痺寒

無熱四
支厥冷
痺湯
熱痺
身熱
升陽散火湯
見勞
加犀角羚羊

又行痺黃耆蒼朮各酒炒二錢羌一片煎調威靈仙酒炒末

羊角灰芥子末溫服走注與歷節不同歷節是支節疼痛末

必行也今將治走注諸方開後如意通聖散虎骨散桂

心散仙靈脾散沒藥散小烏犀丸沒藥丸虎骨丸

十生丹骨碎補丸定痛丸八神丹一粒金丹乳

香應痛丸外貼用牛皮膠一兩水鎔成膏芸臺子安息香川

椒附子各半兩為細末和貼亦有痰涎走注變生諸疾但察並

非風寒濕外感而忽然肢體上下走易作痛神昏多睡或飲食

無味痰唾稠粘夜間喉有痰聲者是也但用控涎丹見數服即

愈

痛痺上部痛羌活桂枝皮枯梗威靈仙臂痛加桑枝羌黃一部

部痛牛膝防已木通黃柏加烏附以引經關節痛穿山甲虎

骨松節上部腫痛五積散見中烏藥順氣散加羌葱發汗

下部腫痛五苓散見傷八症散見大橘皮湯見腫加燈心竹葉

利小便腫而大便不通大柴胡湯見防風通聖散見中筋

痛緩筋湯渾身筋骨痛立效散覺冷者甘草附子湯覺熱者

當歸拈湯湯見身歷節腫痛犀角湯再服茵芋丸肢節痛

大羌活湯外用熨法三年醞醋五升煎三四沸入葱白二三

升再煎一沸濾出布裏乘熱熨之又方羌花桑白川椒各二錢

桂心一兩柳蛙五錢麥麩一升醋炒熱青布裹熨樟木屑一斗滾水泡薰洗勿令氣入眼着痺白米半碗薏苡仁數錢生川烏末四錢熬粥宜稀薄下蒜汁蜜各二三茶匙空心啜之然非有風川烏不宜用張子和以苦劑吐去濕痰次用白朮茯苓寒加附菴煎服着痺大概氣必虛四君子見爲主加去邪之品

○瘧

瘧強直也謂筋之收引緊急而不舒縱也其所以致此者有二一曰寒筋得寒則血凍而堅凝故緊急觀物之寒凝者必強硬可見所謂寒則收引也濕亦寒之屬故經謂諸瘧皆屬于濕也

一曰熱熱甚則灼其血液乾枯乾枯則短縮觀物之乾者必縮
可見也又經謂諸強直皆屬于風者風有內外內風則從乎熱
外風則從乎寒也 經言痿屬濕熱是濕與熱合故筋脈緩縱
詳痿門 痿則濕與熱分故筋脈短縮蓋濕有寒濕有熱濕寒濕如
水之冰凝故堅強熱濕如膠飴之鎔化故柔軟無濕而熱則筋
乾有熱而濕則筋潤也

金匱瘧証謂身熱惡寒

傷寒証

頸項強急面赤目赤

陽明証

頭熱足

寒

陽性上

獨頭動搖

此下乃瘧証所鑑有故用獨字以別之

卒口噤背反張者瘧

病也

太陽

按此乃以寒則收引言然熱為寒鬱而傷血液筋枯致

此者

又謂太陽病無汗惡寒為剛瘧

此寒傷營寒勝血凝筋脈收引之証也有汗

不惡寒為柔痙汗出不惡寒溫病也又謂太陽病無汗而小便

反少內氣虛寒氣上衝胸上逆口勞不得語寒氣盛故欲作剛

痙葛根湯主之以發散大陽又謂胸滿裏熱口噤臥不着席反

甚脚攣急齮齬牙緊也可與大承氣湯見大便不通○又謂太陽

病其症備身體強兀兀然俯仰不能脈反沉迷應浮數而反沉

矣加枯蕒根何為遲當作數為是不遲此為痙枯蕒桂枝湯主

之經太陽之表加枯又謂太陽病項背強兀兀太陽脈下項背

入缺盆無汗惡風此寒傷葛根湯主之有汗惡風此風傷桂枝

加葛根湯主之較葛根湯少麻黃一味已上身體強背項強

拘筋也又謂太陽病發汗太多因致痙又謂風病下之則痙又謂

瘡家不可發汗

指潰後言

汗出則瘳

皆血氣傷損稠燥意

又謂瘡病有灸瘡難

治

血被灸益枯也

合而觀之不出寒熱二端虛實兩途治者取衷焉可

也

按寒熱雖皆足以致瘡而多由于熱以熱者火之有餘也火之

有餘由水之不足故血液枯竭之人

汗下過多亡其津液產後失血後大病後血虛小兒

陰血未足

多患此以水虛無以制火火盛而水愈虧也此為內傷之

証若外感風寒濕氣不過為發熱痺痛等証何遽致筋脈急縮

竟至頭搖齒齟腰反折之甚哉仲景所言外感寒証自不多見

幸溫發散之劑勿輕用也

準繩謂內熱因外寒所鬱則愈甚甚則津液乾燥而無汗大小

筋俱受熱灼而枯縮故曰剛瘳若柔瘳則爲濕熱相兼經謂濕熱大筋短小筋長又謂肺移熱于腎傳爲柔瘳註云柔謂筋柔無力瘳謂骨強不隨則仲景所謂柔者豈非小筋得濕而弛長豈非項背強反張者豈非大筋得熱而強直乎後人乃以無汗爲表實有汗爲表虛而用羌附溫熱等劑寧不增大筋之熱歟其說雖未合仲景之意亦自可取

醫宗金鑑云六經皆有瘳身背屬太陽凡項背強急有腰反張髀不可以前屈胸如結者太陽也身前屬陽明頭面動搖口噤齒齟缺盆紐痛肘膝相構陽明也身側屬少陽口眼喎斜手足摘掣兩脇拘急半身不遂少陽也至若腹內拘急因吐利後而

四肢急非太陰乎尻以代踵脊以代頭

脚掣不能行背俯而曲不能伸意

不能仰者非少陰乎舉九上升少腹裏急囊結舌卷非厥陰乎

按經言足少陰之筋主癰瘕及瘕在外者

外背也腎筋之行于背者不能俯

在內者

內身也腎筋之行于身前者

不能仰又曰腎脈為病脊強反折然則

反張亦屬腎瘕

不獨太陽為然矣

不獨能俯不能仰也仲景謂瘕脈按

之緊如弦直上下行又謂寒濕相搏發汗已其脈如蛇

柔曲而不弦直

為欲解脈如故反伏弦者瘕

從金鑑計定

治法火盛血虛者當歸芍藥生地紅花黃連鈎藤鈎兼氣虛加

人參兼痰加竹瀝金衰木旺

壯火食氣也

先用瀉青丸

見中後用

與攻散

見中氣

獨肝火旺者先用加味小柴胡湯

見寒熱

次用四物

湯

見

加柴胡丹皮山梔

轉熱用加味道遙散

見

若脾土受尅

補中益氣

見

加芍藥山梔

脾土濕熱三一承氣湯

見大便不通

腎虛六味丸

見虛損

太陰寒濕凝結腹痛桂枝加芍藥防已防

風湯手足厥逆附子散桂心白朮湯

汗

汗者水也腎之所主也內藏則爲液上升則爲津下降則爲尿

外泄則爲汗而所以外泄則火之所蒸發也火歸心故謂汗爲

心之液

火盛者雖表固亦出不盛者必表疎乃出

自汗者

乃因發表而汗自出也其出無時火退乃已

傷風傷寒皆熱

蒸汗出中暑病濕亦然

五志過極則生火亦汗出

如驚則心動

越汗隨

出可見勞動則生火飲食則長氣

經云食入于陰長氣于陽氣屬于陽氣有餘是火也

房

事則精泄于下火散于上故皆汗出

火在裏則汗隨藏府出

火在表則汗從經脈出

如太陽傷風熱在皮膚則翕翕汗出乃

胃府之汗也翕翕蒸蒸皆熱貌翕字爲合羽其身如合羽所覆捫之自溫蒸蒸則如炊籠騰越捫之熱氣透手也

春

夏氣浮汗出肌膚秋冬氣沉汗出骨髓故筋骨之疾宜汗者當

於冬至後發之

自汗舊云表虛然不可慨論如傷寒其始無

汗後傳陽明即自汗豈前則表實後則表虛乎

前之無汗則陰邪凝固使然無

論其人平素表實無汗即表虛亦無汗後傳陽明熱盛蒸越無

論其人平素表虛有汗即表實亦有汗問太陽傷風有汗用

桂枝湯非表虛乎曰傷風有汗付汗則表疎故謂之虛是因有

汗而表虛非因表虛而有汗也因表虛而有汗則重實表因有

散風邪非因表也固表乃其兼能耳

有實火有虛火陽虛

即

恒補中

陰虛

即血

腎陽虛腎陰虛皆發熱皆虛火也

火炎則

身溫汗熱而膚純陽虛則身涼汗冷而膚滑

陽衰則衛氣不固又陽虛則不能內

守而易于浮越也然亦有熱極而反出冷汗者蓋熱聚于內肌膚反冷膚冷故汗亦冷也或汗過多陽從汗脫所致然熱盛汗

多而脫者其汗必先熱後乃冷耳

謂熱極反汗冷乃火盛兼水化其說牽強盜汗者寤時無汗

寐時汗出如盜乘人睡熟而出也人寤則氣行于陽寐則氣行

于陰若其人表陽虛者遇寐而氣行于裏之時則表更失所護

而益疎即使內火不盛而陽氣固聚于裏與其微火相觸發亦

必汗出若內火素盛兩陽相搏陰液被擾雖表固者亦必潰

而出矣

其大陰虛尤易動

及其醒覺則陽氣還出于表汗自止傷寒

之盜汗亦然蓋邪在半表半裏時

傷寒

汗不擾故無汗寐則氣挾邪入于表陰被擾而不寧故汗出也
丹溪謂雜証之盜汗有陽虛有陰虛大病後陰氣未復遺熱未清或勞役七情色慾之火或飲食積熱皆足耗損精血陰氣即傷陽火獨旺內蒸成汗也

心孔汗別處無汗獨心孔一處有汗由思慮過多心神浮越使然頭汗別處無汗熱不得外越但上蒸也或因黃鬱未發或

因濕家談下或因水結胸蒸或因火劫熱迫或因陽明蓄血或

因熱入血室並詳傷寒論手足汗別處無汗脾胃之熱達于

四肢也脾胃主肌肉四肢熱達于肌肉則手足汗耳冬月足多汗氣降也

又有手汗汗屬脾胃虛寒不能運行津液乘虛陽外越虛陽被寒

所通而橫溢于四肢者如陰盛而淫雨滂沱也其汗必冷與實

熱之汗其汗不同

脫汗陰盛格陽汗從陽脫味淡不鹹久藏之液則鹹若才經氣

盡併新化之液亦出如珠不流故也為絕汗不治淋瀝如雨拭

則津隨氣脫可知矣

瀕而火正炎熬煎如

膠之粘者皆難治

治法

自汗屬熱者宜清火胃實者宜下涼膈散白虎湯並見承氣湯

見人便酌用氣虛者生脈散見中補中益氣湯見加麻黃根浮

麥不通血虛者當歸六黃湯加地骨皮血氣並虛者黃芪建中湯

見勞自汗畏冷雖炎天必棉衣乃火鬱伏于內不達于表故

外畏寒而內喜熱也防風湯濕痰自汗須去痰導濕每飲

食即汗出益胃散 不論冬夏額上長有汗出因醉後當風致

之名曰漏風漏風湯 病後汗當出察其人精神飲食日增是

餘邪欲散也不須治之若陰氣未復邪熱尚作須與汗理 陽

虛陰乘陰寒之氣一通則虛因自汗而厥者黃芪建中湯見勞

加附子或芪附湯 盜汗當歸六黃湯主之無內熱者表虛者

人而寐時陽氣入裏久亦擾陰汗出防風湯白朮散 肝火當歸龍薈丸見脇有

身熱加地骨皮柴胡黃芪秦艽 肝虛加酸棗仁實加龍胆草

石見實大黃栢知母 脾虛參朮白芍山藥白扁豆浮麥

經霜桑葉末茶調服 心虛熱而陰氣不斂者睡則多驚酸棗

仁湯心實熱者多煩當歸六黃湯加連翹丹皮竹茹 虛勞盜

汗青蒿散

○嘔吐

嘔 惡心

有聲無物爲嘔

於月切嘔也又內經以嘔爲呃逆義別

有物有聲爲嘔無聲有物

爲吐病在胃趙以德則以有聲無物

或有水

爲嘔有物無聲爲吐

有物有聲爲嘔吐謂胃分三脘上脘法天爲清陽屬氣分主動

下脘法地爲濁陰屬血分主靜雖陽中有陰陰中有陽然上脘

終是氣多血少下脘終是血多氣少中脘則氣血相半飲食入

胃亦分清濁水飲物之清穀食物之濁而清中有濁故清之清

者上輸于肺布爲津液清之濁者下輸膀胱出爲便溺濁中有

清故濁之濁者爲糟粕由大腸出濁之清者淫精十息脈若邪

在上脘之陽則氣停水積飲之清濁混亂為痰飲涎唾胸中阻
碍不快清氣不升激而成嘔故嘔為氣病法天之陽動而有聲
與水俱出猶雷震而雨注也邪于下脘之陰則血分滯而食停
吐法地之陰靜而無聲食從吐出猶萬物之吐于地也若邪在
中脘則嘔吐並作飲食皆出矣潔古謂中焦吐者屬積由食與
氣相假為積或先痛而吐或先
吐而痛亦清濁相雜之義氣清食滯也又謂下焦吐屬寒朝食
暮吐則亦屬陰之義也東垣亦謂少陽多氣少血有聲無物陽
明多氣多血有聲有物太陽多血少氣有物無聲皆同此然上
意但氣血多少不以胃之三脘分而以三經分耳勿泥也然上
脘非不吐食也設陽中之陰亦病如土脘有痰血積帶則食入
是有形之物即屬陰即吐不得人于胃見下篇非若中脘之食已而後吐下脘之食久
而後吐也下脘非不嘔也設陰中之陽亦病如雷龍
火上冲則吐與嘔

齊作但嘔少于吐不若上脘之嘔多于吐也 水穀入胃若脾

氣不運清濁不分下趨大腸則爲泄上壅則爲吐故吐與瀉對

講其義便明 水就下火炎上知嘔吐從于火化而屬熱者爲

多則知瀉利從于水化而屬寒者爲多且可知小便淋瀝乃爲

火氣所持不得降諸義皆明矣 是故外感邪入而嘔者胃陽

被鬱而上冲也治宜辛散生羌所必用也不因外感而內熱胃

火上冲者治宜清降石膏所必用也痰濕鬱滯成熱上逆者陳

皮半夏茯苓所必用也食鬱氣滯而上逆者枳實麥芽等所必

用也二便熱結下不通而反于乎上者大黃滑石等所必用也

此治實熱之例也若夫胃氣虛衰不運鬱熱而嘔者則推陽胃

氣寒冷不運壓火而嘔者則溫中散寒胸中虛熱久不食而嘔者但得五穀之陰以和之則立止此治虛熱之例也熱固火逆而嘔寒亦鬱火上逆而嘔故嘔無不本于火者但不得一概治以寒涼耳又若鈴釵之探撥舟車之搖撼惡臭劣味之觸犯皆能擾動胃氣而致嘔夫擾動屬陽火之化也此雖不可以火治而末始不可云火若因其不可以火治而謂之非火且反謂之寒則誣矣一切病症皆同此論之不特嘔吐爲然也或問傷寒論金匱明信嘔吐爲胃寒而乎必歸之火何也曰如但陰寒凝結而氣不上逆何以致吐氣卽火也寒爲本寒鬱氣致上逆爲標仲景特言其本耳熱嘔喜冷惡熱煩渴引飲脈洪數二陳湯見痰加黃連炒梔子枇杷葉竹茹乾薑生羌入蘆根汁服胃熱惡食而吐

聞食氣卽嘔藥下亦嘔並用蘆根汁 下焦實熱二便不通氣

逆不續嘔逆不禁病名走哺人參湯 身背熱臂助牽痛脇間

厭悶食入卽先嘔而後下或作後瀉病名漏氣此因上焦傷風鬱熱

入裏麥門冬湯 嘔若水乃胆熱汁泄取足三里陽陵泉經經

曰諸嘔吐酸皆屬干熱平時津液隨上升之氣鬱積胃上濕熱

不宜故作酸卽酒糟熱則酸之理鬱極則上湧而吐甚則牙齒酸澀不能

相對此爲吐酸平木湯少用萸黃爲從治若不能吐湧而出伏

于胃中咯不得上嚥不得下此爲吞酸肌表得風寒則內熱愈

鬱而酸味刺心若肌表得煖腠理開發內熱得泄或得香熱湯

劑津液行散亦可暫解東垣謂酸味爲收氣乃金旺寒水乃全

子能令母實故用辛熱之劑以治寒

瀉肺其意亦謂太陽經外感于寒則皮毛閉而束熱然其劑終于內耳太陽屬寒水皮毛屬肺金故以金水言之

不可過用丹溪用黃連吳茱萸各製炒隨時合迭為佐使蒼朮

茯苓為輔為小丸吞之黃連湯作丸亦可有宿食亦酸如穀肉

在器濕熱則酸也生料平胃散見傷食加麥芽神麴有痰者開胃

湯怒氣吐逆胸滿膈脹不食常飽食則吐逍遙散見鬱于嘗

病乾嘔服生羌少止誤以為寒屢治不效者十餘年後悞為胃

熱用清熱生津藥而愈如果胃寒則必喜熱惡冷脈遲尿白理

中見中寒吳茱萸等湯自可用昔人患胃寒吐用附子理中湯

加丁香到口即吐後去乾羌白朮只用參附加丁香木香沉香

立止蓋乾羌白朮滯故耳又熱藥有須冷服者若熱服則吐此

熱因寒用之法 羅謙甫云服諸熱藥不愈者紅豆丸神效

嘔吐諸藥不效當用鎮重之品以墜其上逆之氣 痰氣結在

咽膈間粥藥不得下到咽卽吐薑蘇湯下靈砂丹俟藥可進治

之 嘔膿胃脘癰也不必治嘔膿盡自愈 嘔蟲蟲動則惡心

故嘔藥入則蟲必動動則嘔蟲不出而藥反出非計也必於藥

中入炒川椒十粒庶蟲見椒則伏而不動 泛泛兀兀心中快

漾欲吐不吐名惡心氣與痰壅非烏藥不開大半夏湯或小半

夏茯苓湯見痰 仲景云欲吐者不可下之以氣方上湧不可

逆之使下致抑塞憤亂也又云食已卽吐火大黃甘草湯下之

者以既吐矣吐而不已有升無降當引合下行也 區士律友

既出必渴宜生津 嘔吐大痛色如青紫葉者死

○反胃噎膈

吐而不已至每食必吐名反胃胃脘枯槁梗澀難入飲食噎塞

迎逆于咽喉之間名噎噎塞迎逆于胸膈之間名膈

過此乃得入胃

醫謂噎膈年高者有之噎則水飲可入食物難入入亦不多

膈則食雖可入亦不能多良久復出二者皆難于納勉強吞下

終帶痰涎或白沫酸水或如醬汁者而出反胃非不能納

原能多食

乃不能容受朝食暮吐暮食朝吐或一二時而吐或積至一日

夜腹中脹悶不安而吐

亦有食已即出者

原物酸饒不化男女老少皆

有之 丹溪謂得之七情六淫遂有火熱炎上之化多升少降

津液不行積為痰飲被劫時

以熱藥劫治也

暫得快

津液得幸

不久復

作前藥再行積成其熱血熱衰耗胃腕乾枯大便秘少如羊矢

然火盛糞乾堅小又腸亦必外避六淫內節七情飲食自養滋乾小故尿不潤不大也

血生津以潤腸胃則金無畏火之炎腎有生水之漸脾氣健運

而食積傳化矣王太僕云食入即出是無水也

噎膈反胃皆有之

食

久反出是無火也

反胃有之噎膈無此

無水者壯水之主六味主之無火

者益水之原八味主之

虛損並見

火逆衝上食不得入脈洪數有

力者滋陰清膈飲加枇杷葉二錢蘆根一兩

又有一種肝火

鬱而不伸亦嘔不納食亦心痛但所嘔者酸苦青藍水大小便

多不秘

亦有在秘在泄者

用吳茱萸黃黃連濃煎細細吸之再服逍遙散

見愈後六味丸

詳參

痰飲阻隔食纔下便為痰涎裹住吐出者

以人神來復丹控其痰涎

見痰飲

血稿者地黃麥冬當歸煎膏

入韭汁乳香童便蘆根汁桃仁泥細呷之大便秘澁加桃仁泥

玄明粉但食物下咽覺屈曲自膈而下梗澁微痛多是瘀血用

前藥後以代抵當丸

見血

行之瘀瘀血在膈間阻礙飲食代抵當

丸芥子大三錢去枕仰臥細細嚥之令搜盡停積天明利下惡

物將息自愈五靈脂為末黃大胆汁和丸龍眼大每服一九好

黃酒溫服三次亦行瘀之妙劑也 有蟲者秦川剪紅丸取之

此丸亦取瘀血噎病喉中如有肉塊是食滯於此不下也麥昆

煎

童便

降火

竹瀝

行瘀

姜汁

佐竹

韭汁

行人乳牛乳

補虛

蘆根汁

潤燥

止茅根汁

涼血

甘蔗汁

和

驢尿

殺蟲

仍入燒酒米醋蜜各少許和勻

隔湯頓溫服得藥不吐切不可便與粥飯食物每日用人參五

錢陳皮一錢作湯細啜數日後方可飲陳米湯及粥糜 張子

和曰內經謂三陽結爲膈三陽手足太陽小腸經膀胱經也結

謂結熱也小腸結熱則血脈燥膀胱熱結則津液涸二便秘塞

下既不通必反上行所以噎食不下經又曰少陽所至爲嘔涌

食不下又云肝移寒于心爲狂膈中盡陽氣與寒相薄故膈食

中不通非獨專于寒也醫者不察妄用熱藥人言可下退陽養

陰張眼吐舌恐傷元氣惟劉河間三一承氣湯

見大便不通

獨起千

古假如人閱慎勿徒效從得收開必慮後患宜先問養小生易

丸累累加之聞局自透其或涎痰上阻輕用酸苦微瀉因而沿
下藥勢易行設或不行寧臨下導始終勾引兩藥相通結散陽
消飲食自下一官病此十年大便澀燥小便黃赤子以四生丸
下三十行燥矢腸垢何啻數升其人昏困一二日頻以冰水呷
之漸投乳酪芝蔴飲數日外大啜飲食而愈 有極力叫呼氣
喉損破氣併胃管喉破氣不能從喉管行故從胃管行壅塞致吐法在不治牛喉
管焙乾服之 酒客多噎膈飲熱酒者尤多以熱傷津液咽管
乾澀觀其口苦乾澀可知食不得入也

霍亂

霍言其手足之擾動如揮霍也亂言其內之邪正變亂也其証

心腹卒痛或吐或瀉或吐瀉交作甚則兩足轉筋轉筋甚而從足入腹或通身筋皆轉舌卷囊縮者死若無吐瀉而止轉筋腹痛者名乾霍亂即俗所謂攪腸痧也病由邪氣結滯中焦阻隔上下正氣不通上之陽氣不得下通下陰則上壅故吐下之陰氣不得上通干陽則下迫故瀉也

此言陽上陰下之阻隔也亦有陰上陽下者又有陰陽參錯清濁邪正混淆寒熱互爭彼此拒格不通者干

是血氣營衛之行失次彼順此逆搏擊于中矣上吐下瀉則中焦之邪得以分消有不藥亦愈者若邪氣熾盛吐瀉適足虛其正氣邪愈結而不運矣

轉筋由筋中素蘊火邪血液久虛所致然未遽然也若因霍亂吐瀉頓亡津液則血液之虛者愈

虛或不因吐瀉而外冒風寒腠理閉密熱氣拂鬱激發則火邪

之烈者愈烈乾霍亂之轉筋及尋常轉筋以此于是彎縮急痛而不可忍矣觀

其情形急暴屬火無疑或以爲寒謂寒則收引不知收引特拘

急牽強耳與轉筋之彎痛異常者不同焉可溫哉或疑轉筋多

在足明屬陰寒益足居下部屬陰多寒又感風寒筋脈收引勁

急霍亂不論寒証熱証皆邪結中焦陽氣不能下達兩足必冷

故每轉筋若果由火熱則是筋皆轉矣何獨足乎此論足獨轉

筋由于寒亦有理然謂一于寒而中無火邪則非矣若無火邪

則陰凝而靜斷無躁急轉戾之理且霍亂乃脾胃病故足獨轉

筋不可謂必由于寒也丹溪治徧身轉筋入肚作極鹹鹽湯

于槽中煖浸以潤其燥血熱也寒而動急者亦可用以軟堅治霍亂當審其爲

何邪河間謂爲熱甚所致火性燥暴也凡暴病暴死皆屬于火也準繩謂以脾濕爲本脾濕盛則亦鬱而生熱也張子和則以風濕熱三氣合而爲邪蓋脾濕土爲肝風木所尅肝木清氣爲濕所遏不得升不升則濕愈不鬱爲熱而暴發發則心火上炎故吐脾暴下行若受木尅者然流則瀉也王海藏亦謂風濕熱與食相合爲邪明理論則謂他病霍亂多由飲食所傷若傷寒霍亂則由邪入中焦胃氣不和困之陰陽否隔而致諸公之論當兼採之不可執一說以誤入也大抵夏秋之交最多此証蓋夏月人多食冷飲水其寒濕之氣與暑熱之氣交搏胃中是爲寒熱不和卽無所趨遏亦將入而病發若外感風寒內傷飲食則閉滯不行其發也暴矣病之

將作必先腹中疝痛痛高近心則先吐痛下近臍則先瀉因胃

風則惡風有汗因胃寒則惡寒無汗胃濕則身體重着傷暑則

心旰煩燥問其曾否食過何物曾否七情動氣更分寒熱虛實

治之氣少唇青肉寒四支拘急畏冷喜熱脈沉遲人事清醒

者寒也霍亂暴証原屬于火但火由理中湯見中脈絕者通脈

四逆湯見吐利不止元氣耗散格陽于外或口渴喜冷得水則

不能飲或發熱煩躁欲去衣被不可誤以為熱宜理中湯甚則

附子理中湯並見中寒不效則四逆湯並見中寒宜放十分冷服轉餅者

理中湯去木加生附子一枚或理中湯加凍膠剉炒一錢並見中寒

狀如凍膠故加此或煎濃鹽湯浸仍縛繫其腿脰勿令入腹或

治之且以潤其燥

灸承山二十七壯神效

一法男子手挽其陰女子手牽乳近兩旁

身熱煩渴氣粗口

燥喜冷畏熱心神悶亂脈洪數者熱也若更四支重著骨節煩

疼者兼濕也中暑霍亂宜香薷飲

見中

井底沉極冷頓服桂苓

白朮散亦妙濕盛者除濕湯

見中

訶子散暑濕相搏者二香散

熱多飲水者五苓散

見傷

轉筋者木瓜煮汁飲之或香薷煮汁

亦可或燒梔子二十枚為末熟水調下煩渴者吐瀉後津竭也

止渴湯增損縮脾飲茯苓澤瀉湯小麥門冬湯霍亂後下利不

止腹中疴痛恐作痢宜黃連丸霍亂後下利見血止血湯赤石

脂湯

按寒熱諸症疑似難決必參諸脈然霍亂氣閉脈多沉

伏不見或瀉滯歇至

須辨其應指

則亦難辨矣切不可妄投藥

且先以陰陽水分理之刮痧法最妙能霍亂尤宜法用磁碗之
精細者湯溫之香油抹邊令滑不傷肉刮脊兩旁俞穴引出藏
府之邪又刮手足灣引之四散熱血隨刮透出起紅紫疙瘡紅
者輕紫者重黑者更甚蓋氣結則血凝血凝則氣愈滯血散氣
行則立愈矣 七情鬱結者七氣湯 脇下痛者木剋土也建
中加柴平木瓜湯 兼外感風邪者六和湯見傷暑 倍藿香煎熟
調蘇合香丸見諸中 大抵蘇合香丸藿香正氣散見中風 最能通關
理氣所必用也 霍亂非有邪不致有邪即為實雖虛人亦不
得純補惟吐瀉後當細察之若已透暢人困弱脈虛軟是邪已
去而正虛也若吐瀉未透脈仍瀯滯有力人仍煩躁不寧是邪

尙未盡也須別之 吐瀉不止頭目暈眩肢冷轉筋須與不救

者吳茱萸湯汗出厥逆不解者四逆湯見吐瀉後小便利汗出

者卽內外熱亦宜溫之吐瀉後二便不通胃中實痛者結糞留

滯四君子見加大黃一兩吐瀉後胸膈高起痞塞欲絕理中湯

見中加枳實茯苓吐瀉已透而餘吐餘瀉未止腹有餘小宜正

味報秋豆葉煎服乾者尤佳 羅謙甫治一人傷酒肉瀉乳霍

亂吐瀉脈沉數熱未去也按之無力所傷之物已去以新汲水半碗調桂苓

白朮散徐服之少安又于墻陰掘地二尺許入新汲水攪之澄

清各地漿再調服之而愈墻陰土重陰也暑熱躁甚非此不除

又治一人年八十中暑霍亂吐瀉昏迷頭熱如火足冷以桂苓

甘露飲瀉熱補氣降浮火以安神明加茯苓以分陰陽冰水調
灌之而愈再以參朮調中湯調理平復妊娠產後霍亂不外上
法但須顧胎防虛

乾霍亂不得吐瀉則邪結中焦用溫熱立死炒鹽入新汲水乘

熱多飲探吐之不吐更服吐仍飲三吐乃止

大抵邪盡此法極
即止勿泥

妙凡欲吐而不得吐及吐不透者並宜之須極鹹乃妙吐後心

腹疔痛頻欲登圜苦于不通藿香正氣散

見中

加枳壳一錢生

更多下米復丹

見中暑若瀉則
不可用此丹

不效須用神保丸

見傷
飲食但此丸

必到大腸乃行若隔于上則轉服轉秘須用來服丹研末湯調

吞養正丹

見

百粒庶可引前藥到下戴復菴法先服濃鹽湯探

吐次調蘇合香丸吞來復丹仍進霍香正氣散加木香枳壳

厚朴湯 活命散 冬葵子湯 頂心有紅髮急拔之取青蒿

汁和水飲愈或刺委中穴併十指頭出血亦妙 火甚者藥須

反佐古方煎鹽湯調葷便人藥取其下降以通陰也莢能行血

凡霍亂切不可與粥飲葷邪滯未化穀食一入益結滯不行往

往致死併忌酒羞湯蒜烏梅醬熱湯一切收斂溫熱之藥

○泄瀉

泄瀉之症水穀或化或不化腹痛或不痛並無帑責亦無膿血
及裏急後重惟覺困倦耳故與痢疾異 飲食入胃下小腸得
氣運行則清濁以分水滲膀胱穀趨大腸二便調矣何泄之有

若氣不運化水穀不分歸併大腸一路則瀉矣而氣之所以不
運則六淫七情種種之邪皆得而滯之畧具如左

或因于風經曰春傷于風夏為殭泄言春時傷于風寒由皮膚

而經絡傳入腸胃腹脹腸鳴風氣往來腸胃間冲擊作响也因而殭泄也泄出原食

不此風非汗不出始為寒氣久則鬱熱又肝木之氣亦名為風

春時肝氣宜升為邪所傷鬱而不陷鬱久成熱熱久蒸化為濕

遂至殭泄此宜升清除濕三証皆腸鳴肝風內瀾脈弦泄時或亦鳴响

閉而不下下多白沫辟辟有聲其氣不甚臭穢以完穀不化也

夏以久言勿泥或謂春木當令雖不能升亦不肯下趨但鬱成熱至夏熱盛蒸濕如雲蒸而雨降故至夏乃泄

亦通

部

或因于寒蓋寒則氣凝無以通行水穀故泄也寒氣攻刺腹中

綿綿作痛腸鳴暴下無聲水穀不化所下清冷如鴨屎之瘡大便

如水中有少黃也小便白脈沉遲身冷脈細虛心皮寒肺虛前後泄利腎虛

飲食不入脾虛為五虛難治用參朮補劑早救之遲則不能挽矣

或因于熱蓋火性急迫逼其水穀下注往往不及傳化即出勿

因其完穀不化誤作虛寒其脈洪數小便赤澀腹中痛刺痛

一陣瀉一陣口燥渴糞出辟辟有聲肛門熱痛熱瀉固由火

性急迫亦有熱氣壅滯不行不但寒不能運也所下多垢粘色

黃赤腹中悶痛

或因于暑與熱同理証則面垢多汗煩渴

或因于濕濕盛而小便不利水走腸間漉漉有聲腹不痛脈沉
緩體重軟弱治濕宜利小便若氣虛下陷而利之是降而又降
也當升其陽所謂下者舉之也升陽用風藥風藥又能勝濕
或因于食蓋傷食則脾滯不能運行水穀故泄噫氣如敗卵臭
腹中絞痛痛一陣瀉一陣下過稍寬少頃又痛所下臭穢粘膩
前食較滯則後食繼停陳色黃

陳相因久而乃出故臭穢

或傷于酒每天明時瀉一二次

酒質濕夜氣陰寒不能久攝故至明必瀉

或因于飲渴而飲飲而瀉瀉而復渴復飲復瀉也

或因于痰痰滯氣不行故水穀不分腹中隱隱微痛或覺冷下
如稠飲時瀉時不瀉或多或少或不食不飢昔肥今瘦脈滑

有脾虛不能受食食畢卽腸鳴腸滿必瀉出所食方快不食則無事名脾泄

每天明時瀉一二次名腎瀉

腎火虛寒也

有肝氣滯兩肋痛而瀉者名肝泄

有患口舌糜爛而瀉者乃心脾二經之熱心開竅於舌脾開竅于口其熱上攻故糜爛若移其熱于胃與小腸則運化失職故泄也名口糜泄

人瀉不止名滑泄又名洞泄大孔如竹筒飲食入口直出無禁氣將脫矣飲食不進則無救矣

治法

風瀉升陽益胃湯

見前

寒瀉理中湯

見中 漿水散

熱瀉益元散

暑見傷

加苓連燈心竹葉止瀉湯去白朮加黃連滑

石扁豆熱止在上脘渴而引飲水入胃中胃本無熱不能行水

致瀉灸第一椎下陷中五苓散

暑見傷

亦可

暑瀉青六九

痢見傷

龍丸濕瀉胃苓湯五苓散升陽除濕湯吞戊己丸止瀉湯寒

濕加羌桂熱濕加黃連葛根

食瀉平胃散

飲見傷

加枳實番其

胃傷何物仍燒此物存性調服三五錢形氣實者下之酒瀉

理中湯

見中

加乾葛吞酒煮黃連丸

暑見傷

或葛花解酲湯

飲見傷

飲瀉實者神佑丸

見腫

虛者春澤湯

見傷

白朮調中湯

痰

瀉止瀉湯加半夏海粉實者吐之下之虛者六君子湯

氣見傷

泄快脾丸

腎瀉四神丸早晚二服

肝泄止瀉湯加柴胡青

皮若因肝氣不斂致脾氣散而不運加白芍口糜泄其証上
發則下止下泄則上愈當口糜發時用瀉心導赤散滾湯淬服
若當泄瀉時則早晚用參苓白朮散糯米湯服若小便少利不
止乃水走大腸用茯苓車前子各等分煎湯代茶若服寒涼藥
口瘡不効則爲虛火上泛理中湯加肉桂大倍茯苓降陽利水
陽降則口糜愈水利則泄瀉止久泄八桂散或四君子氣見加
肉果升麻仲景云下痢不止以理中與之益甚理中者理中焦
此利在下焦赤石脂禹餘糧湯丸主之瀉久不止多變爲痢
詳痢實者以厚朴枳實湯預防之虛寒者四神丸收瀼之劑
固腸湯訶子散皆治熱瀉扶脾丸桃花丸訶子丸赤石脂禹餘

霍湯皆治寒滑泄瀉久不止不可離甘草芍藥為脾病也不

可離白朮為濕也思枳殼為能寬腸也思黃歸為能滑腸也補

中益氣皆瀉已愈至明年此月復發者有積也熱積大承氣湯

白乃代之見大便不通虛者保和丸見傷加三稜蓬朮之屬寒積備急丸見傷

理中見中加茯苓黃連名連理湯寒熱雜合而瀉者最宜如

瀉垂內傷生冷或熱邪已解而凡瀉津液既去口必渴小便

多赤澀未可便作熱論必初起即渴即陰陽已分瀉已止而

小便少者此肺氣虛不能生水補中益氣湯見加麥冬五味或

腎陰虛而水自涸六味丸見虛加麥冬五味或腎陽虛而陰無

以化八味丸見虛若再行滲利則小便益不行而水入不消腫

脹之症反作矣 瀉脈必沉宜細小不宜大數實 下泄上吐
痰皆不已爲上下俱脫死腹大脹手足厥利不止形脫死

腸鳴

大抵氣與水相沖擊而成聲氣多則響高水多則響沉或無
水而有痰食之閉塞氣閉忽通則鳴也氣有寒有熱熱則氣盛
其沖擊必有力寒則氣不足不足本不能沖擊然鬱積久之則
亦必通觀寒凝腹痛者以炒葱熨腹則痛響而氣行痛止
可見也是故氣之和平而流暢者不鳴也必其或熱或寒有寒
有通而後鳴經謂熱淫所勝病腹中雷鳴氣上沖胸治以鹹寒
又謂中氣不足腸爲之鳴脾虛腹滿腸鳴飧泄食不化是也胃

寒泄瀉腸鳴升陽除濕湯

見泄瀉

加蒼智仁牛夏棗朮火摯水者

二陳

見痰

加芩連梔子

水氣客于大腸疾行則鳴濯濯加薤白

水之聲河間葶藶丸

二痢

痢由濕熱所致或飲食濕熱之物或感受暑濕之氣

不論外感

七情飲食勞倦皆能致濕熱

積于腸胃

不論何藏府之濕熱皆得入腸胃以胃為中土主容受而傳之腸也則

正為邪阻脾胃之運行失常于是飲食日益停滯化為敗濁膠

粘腸胃之中運行之機益以不利氣鬱為火與所受濕熱之氣

混合為邪攻刺作痛此痢証所以腹痛也

舊謂肺金之氣鬱于大腸間蓋以氣屬肺

為言耳不必泥定是肺氣也口實熱者火性急迫不得宣通其痛必甚虛寒則痛微蓋寒閉則痛甚寒開則痛微病者雖滯而

不暢終是開而非開虛邪能傷正傷在血分則便血曰赤痢當

者少氣不甚壅故痛微

腸風傷在氣分則便膿曰白痢膿有二一則胃中津液一則水

參食腐敗往往化為白膿可見而津液稠濁上出為痰下出為

膿尤其明著景岳謂是腸間脂膏剝刮而下不思腸胃之裏並

照暗膏止有涎沫觀諸腸可見矣又大腸合肺主氣小腸若血

合心主血故古謂血從小腸來膿從大腸來不必泥也

氣血傷則紅白兼見又或濕盛血敗而色如豆汁或熱極而色

見黑血而光如漆者為癆或久痢而元氣虛弱濕痰敗濁色

腥如屋漏水中源蓋屋用泥故或証轉虛寒色如魚膽如鼻

涕如凍膠色同白痢但有初起或藏府敗壞而色如死猪肝雞

肝其色此痢之所以有各色也氣既鬱滯腸中則欲升不升

欲降不降忽而下逼火性迫促竟若不及更衣然欲降而不能

升其色此痢之所以有各色也氣既鬱滯腸中則欲升不升

欲降不降忽而下逼火性迫促竟若不及更衣然欲降而不能

升其色此痢之所以有各色也氣既鬱滯腸中則欲升不升

欲降不降忽而下逼火性迫促竟若不及更衣然欲降而不能

升其色此痢之所以有各色也氣既鬱滯腸中則欲升不升

欲降不降忽而下逼火性迫促竟若不及更衣然欲降而不能

降雖就固却無所出

氣鬱不宜則膠固之積不出即日食之糟粕亦銷樂膠枯所出無幾

不降而

偏欲降總淨手又要更衣急迫頻併最是惜人是爲裏急邪迫

肛門氣凝血聚因而重墜

亦有脫滑者必久病乃見

是爲後重痢本濕熱痢

久陰傷濕熱轉成燥熱肛門如火廣腸血枯雖極力努責

責求

力以求其出也

而糟粕乾澀欲出不能但虛坐而無所出是爲虛坐努

責瀉痢皆由於濕而濕有寒熱皆能作瀉痢則因濕熱

是是

即當洞泄無結滯不通欲出不出等証

謂痢有因寒濕者諺也

均之濕熱而或瀉

或痢何也曰瀉因濕熱驟盛火性急速遽迫水穀暴下不及蒸

爲腐敗傾盆而出腸胃即清故無膠固垢積積滯既無氣行弗

礙瀉降而氣隨升故無裏急後重病發既速則血氣未傷故無

赤白血膿痢則濕熱尚微積漸乃盛盛而後發為日既久遂蘊
釀出如許証候耳 有先瀉後痢者因濕熱多濕已瀉出熱尚

未除且瀉久亡陰陰虛又復生熱濕火轉成燥火刮逼腸垢與

血而下故轉而為痢也

右謂此為脾傳腎以脾惡濕腎惡燥此証先濕傷脾后燥傷腎故曰脾傳腎也

其病為進

有先痢後瀉者因濕多熱少痢久熱去而濕猶存火

與元氣不兩立邪熱既去則正氣得復正不容邪所餘垢積與

濕至是盡行掃蕩

此邪在中肺氣被熱去則肺氣下行化水四佈有若時雨溝澮皆盈垢積盡蕩矣故

轉為瀉也

此為腎傷脾其病為退後邪也

夏時受邪至秋病發或癰或痢其流則異其源則同

蓋夏月感受風涼

食生冷風寒客于肌膚邪正雜處生冷停于腸胃濕熱相蒸其時腠理開通未至若閉鬱氣升發未至過抑在秋而氣發火炎

邪在肌膚皆微欲而內爭爲瘧
在腸胃皆微降而下迫爲痢也

瘧痢並作者如瘧止痢甚加

腹痛飲食少進此虛寒也瘧之止非真正乃陰勝而陽不敢與

爭耳補中益氣湯

見氣

加薑桂一服愈如痢止瘧復作乃陽得補

而漸伸能與陰爭故瘧復作吉兆也再服前方以助微陽之力

加附子五錢二証並除按此說甚是然豈無熱陷於裡不與陰

爭又豈無熱勝寒衰陰不敢爭故瘧止痢甚者乎一陽三反是

在明者

再按瘧痢並作必先治瘧以表有風寒宜先解表若先治痢恐虛其裏致去邪內陷也

瘧後痢致

飲邪內伏或脾胃氣虛下陷使然謂之似痢非痢後瘧乃氣

血兩虛氣虛則發熱惡寒血虛則發熱故寒熱交爭似瘧非瘧

二者俱作虛治並用補中益氣湯

凡痢症有身熱者爲重若兼外感者

外感風寒鬱爲濕熱致用

不在此論苟

非外感而初起身熱是毒盛於裡而達於外也久痢身熱是陰

虛而陽越于外也故皆爲重論

嘔逆爲火邪上衝亦不宜見此卽防噤口

噤口有因積垢壅滯有因宿食不消者有因熱毒上衝有因停
飲上逆有因兜澁太早邪反上于有因過服寒劑傷敗胃氣以
致飲食與藥俱不能入卽吐出此爲危候胃憊氣陷絕不思
食者不治

屢止屢發經年不愈者名休息痢多因兜澁太早積熱未清或
過服寒涼元氣下陷腎虛不固所致

時行痰痢當求其時氣而治之蓋必有彼此相同之証候卽其

氣也

如皆見身重卽爲時氣之濕也

凡痢初起必無寒証然其人平素陽虛元氣衰弱又復過食生冷以致火鬱蒸成濕熱其標雖熱其本則寒治當求本若夫病久氣虛或過服涼劑轉爲寒証因甚多矣所當細察如始見煩渴引飲喜冷畏熱小便赤澀面色黃赤手足溫煖脈見數盛久之則心不煩口不渴卽渴而喜熱飲小水由赤而黃由黃而白面色亦轉青白手足不溫而冷脈變虛弱則証轉虛寒無疑虛實當辨如腹痛拒按者爲實喜按者爲虛膿血稠粘數至圓而不能便者爲實不及拈衣而卽泄出者爲虛未經瀉蕩而反

重者為實已經瀉蕩而仍后重者為虛邪實之重糞出少減各
前墜也少頃又重邪未盡也虛滑之重糞出愈甚名糞后墜少頃畧可甚時
略鬆也氣復升故也凡痢中所有之証如煩渴咽乾舌黑腫脹之類悉有
虛實之殊無得概指為實當細別之

脈法

痢為裏証脈宜沉惡浮有表邪者宜細惡大初起邪盛者宜緩
惡弦不在此論

治法

初起宜利濕清熱疎通積滯若久痢亡陰濕轉為燥則利濕又
在所禁不持此也濕不盛者初起亦不可本寒標熱証見虛陽

則寒劑又在所禁舊積已去新積旋生則下劑又在所禁矣

而復生者血氣凝滯故也但當調其氣血耳不特此也舊積而

快虛亦不可下丹溪治葉氏先補完胃氣而後下之再按積

垢膠固腸胃與溝渠壅塞相似刮磨疏通則可木香檳榔丸之

類是也輕用硝黃牽牛巴豆等碎以清水為礮寒之藥安得疎

暢必壯實人初起始可以一下而愈胃氣弱者不宜

利濕 五苓散見傷 益元散見傷 等 清熱 香連丸 白

頭翁湯等 鹽積 承氣湯見大便 芍藥湯 積利丸 導

氣湯 脈浮大忌下 調氣 藿香正氣散見中 加木香吞感

應丸見傷 血痢加黑豆三十粒 黃連阿膠丸 白頭翁湯

香連丸 蘇合丸見諸 和血 芍藥湯 腹痛 紫參湯 肺

氣鬱于大腸苦梗發之 或食粥稍多或飢甚方食在中作痛

白木陳皮各半煎湯和之仍奪食傷冷水瀉變痢腹痛食減

燥熱困軟茯苓湯

服弦或瀉或浮虛建中湯

見勞傷

當歸芍

藥甘草能和腹痛

裏急宜行氣清火

後重宜調氣木香檳

榔

宜下其積滯下墜異常積中有紫黑色又痛甚為死血桃

仁泥滑石粉行之

盪積後仍重為大腸滑墜餘邪未盡若升

消散兼升兼消已盡宜御米壳等瀉之如升麻以升其陽按東

垣云裏急後重數至圉而不能便或少有膿血慎勿利之宜升

陽除濕防風湯

見血

此當是濕熱鬱閉上氣不通所致故升其陽

而便自下古云大便秘通用升麻即此意也

虛坐努責血虛

腸燥不能出當歸為君生血藥佐之滑脫

桃花湯

斷下

湯 養臟湯 白朮安胃散 固濟藥中須加陳皮爲佐恐太

瀉能作痛 甚者灸天樞氣海 凡痢初起邪實當去積滯俟

腹不痛卽愈不愈可用鴉胆丸止之 脫肛 訶子皮散 磁

石末二錢空腹米飲下外用鐵鏽磨湯溫洗 天孔痛 熟艾

黃蠟訶子燒重之食淡味自安 天孔不閉 葱和花椒末搗

爛塞穀道中 御米壳訶子皮各一錢爲末米湯下 噤口以

脈証辨之如脾胃不弱頭疼心煩手足溫熱未嘗多服涼藥者

此乃毒氣上衝心肺所以嘔而不食宜下或用敗毒散見傷 每

服四錢陳倉米三百粒羌三片棗一枚水一盞半煎八分溫服

若其脈微弱或心腹膨脹手足厥冷初病不嘔因服芫栗壳

易物苦澁寒治太過以致聞食先嘔者此乃脾胃虛弱用山藥一味剉如小豆大一半入瓦銚內炒熟一半生用同爲末飯飲調下 又方石蓮搥去壳留心并肉研爲末每服二錢陳米飲調下此疾益是毒氣上衝心肺借此以通心氣便覺思食 山溪口人參黃連羌汁炒濃煎汁終日細細呷之如吐再吃但一呷下咽便開痢亦自止神效 人參黃連石蓮煎湯徐呷外用黃瓜藤葉經霜者燒灰香油調納臍中卽效 仁齋用參苓白朮散見世加石菖蒲末以道地粳米飲乘熱調下或用人參茯苓石蓮肉人些少薑蒲與之 愚謂莫妙于問病者所欲食之卽開 挾暑自汗發熱面垢煩渴嘔逆小便不通香薷飲見

著加黃連益元散

見傷暑

腹痛食不進六和湯

見傷暑

藿香正

氣散

見中風

各半服

板寒

外感風寒先宜發表倉廩湯汗之次

乃治痢

酒痢葛根湯

久痢

或瘀血或食積或頑痰或元氣

虛弱當隨証治之

丹溪治族叔病雖久而神不瘳小便濇少

而不赤兩手脈俱濇而頗弦自言胸微悶食亦減因悟必多年

沉積癖在腸胃詢其平生喜食何物曰喜食鯉魚三年無日不

用此積痰在肺肺為大腸之藏宜大腸之不固也當與澄其源

而流自清以萊菔陳皮青葱薤白根生薑煎濃湯和以砂糖飲

一碗許自以指探喉吐痰半升如膠其夜減半次早又服又吐

痰半升而痢自止又與平胃散

見傷飲食

加白水黃連旬日而安思

按小便瀉而不赤非熱矣非熱而瀉則肺氣為痰所滯合之胸

悶食減脈瀼強知痰在肺也

休息痢

宜四君子湯見加陳皮

木香吞駐車丸兒寒太早有餘積者利積九去之后用神效參

香散經年累月愈而復發補脾不效此係寒積在大腸之底

諸藥不能到故無愈日用巴豆一味研炒蠟丸桐子太容腹米

湯送下七八九一服永不再發感應丸見傷食亦佳喻嘉言治

周信川休息痢陽邪陷人陰分以有條捲成鵝蛋狀墊肛門厚

被圍坐熱飲人參敗毒散見傷良久又飲透覺皮間微有津潤

令其努力忍便不得移身約二時久病者心燥畏熱不能忍始

令連被臥病即減改服補中益氣湯見旬日愈蓋內陷之邪須

提出之以挽其下出之勢又須緩緩透出方為合法凡久痢久

瘧久熱等症皆須識此意 勞痢痢久不愈致虛五心發熱如

勞証積連飲蓮肉山藥各等分亦多倍蓮肉白多倍山藥愈后

異功散見氣或平胃散見傷飲食加參苓清陽下陷始則瀉泄久則

腸澼亦見裏急厚重腰血相錯專用補中益氣見氣痢不治而自

止不效是無火也急用八味丸見虛損大瘕泄亦見裏急後重

紅白雜便則痛欲小便大便先脫欲大便小便自還或小便澀

痛或不通或大小便牽痛急用八味丸見虛損加故紙肉蔻阿膠

治之不可用痢門藥也說詳醫貫瀉痢門中參下淋症似淋非淋條刮

腸諸病壞症久下膿血或如死猪肝色或五色雜下頻出無禁

有類滯下俗名刮腸此乃虛脫之証若投痢藥則誤六柱散去
附子加益智仁白芍藥或可冀其萬一 痢后風之痛或痺軟

或脰腫或膝腫名痢后風因痢后下虛感受風濕留滯關節所

致獨活寄生湯

見腰
痛

吞虎骨四斤丸

見脚
氣

或大防風湯外以杜

牛膝杉木節白芷南星葶藶煎湯薰洗若惡血痢下未盡留滯

經絡作痛叫號者日久恐成鶴膝四物湯

見

加桃仁紅花牛漆

黃芩陳皮甘草煎生薑汁研潛行散入少酒飲之數十貼又刺

委中出血又方松明節一兩乳香二錢炒焦存性蒼朮黃柏各

一兩紫葳一兩半甘草五錢桃仁去皮不去尖一兩爲末每服

三錢生薑同拌細水盪起二三沸服若由下多凶陰而致者補

脾胃生血忌用風藥

用藥禁忌初起忌溫補卽胃氣虛弱下不宜黃芪尤禁用之則發脹忌兜塞亦禁升麻非元氣下陷而用之升毒上于速死之道忌利小便非濕盛小便不通而利之致津竭熱熾必劇忌發汗非表証而妄汗致津涸熱盛必劇禁酒痢時酒則難愈愈則復發

○大便不通

有熱結者熱耗血液乾燥故結也脈洪數能食卽仲景所謂陽結麻仁

丸四順飲子吞潤腸丸若燥實堅腹滿痛承氣湯見中治之

有寒結冷氣隱于腸胃陰凝不運津液不通故結也脈沉遲不

能食腹痛

即仙景所謂陰結也

寒而實者備急丸

見傷飲食

溫脾湯寒而虛者

半硫丸薤汁調乳香吞之或八味丸

見虛損

外用桂藥

有氣秘氣壅塞不通不升不降其人多噫實者破結導滯木香

檳榔枳殼陳皮杏仁等類虛者

氣虛不通故壅滯

補而行之不宜破哉

人參多用若氣阻隔不通而見臍脇反胃等証者人參利膈九

四磨湯

見氣

選用仍分虛實治之若氣少氣弱無力推送則惟有

助氣而已

肺主氣肺與大腸為表裏氣秘治在肺

丹溪云肺氣不降則難傳送用

枳殼沉香訶子杏仁等老人虛人津液少宜滑之用胡麻麻仁

阿膠等

有血秘老人

老人後門

產後有秘至數十

血液乾枯或病

後血虛或發汗利小便以致津涸

津亦屬血

均宜潤劑苳蓉潤腸丸

更衣丸四物湯

見血

麻仁杏仁辛潤之品又腎司二便腎水虛燥

宜以六味

見虛損

滋水少佐辛味以潤之若跌打損傷瘀血凝滯

致氣不行而大小便不通者破瘀導滯為主

有風秘其人腸胃素有風風能燥濕燥血故大腸不潤而結搜

風順氣丸

見風

滋燥養榮湯

見虛損

老人氣血多虛察其脈浮虛者氣虛也沉虛者血虛也

凡結實難下之証可用穿結及妙香丸

見煩躁

燥屎巨硬結在肛門難出名直腸結從導法治之

導法以蜂蜜煉成條太如指粘皂角末油抹入便門寒結者加

草烏頭末以化寒消結熱結者以猪胆汁導之

○大小便不通

証在危急非地中蚯蚓泥搗和水澄清飲之立通 又方大黃

滑石皂角各三錢爲末如小便勢急倍滑石大便勢急倍大黃

又推車子七個土狗七個新瓦上焙乾爲末以虎目樹即虎

皮向東南者煎濃湯調服 又皂角末葱白連鬚加麝香二分

蜜少許搗貼臍下至毛際 濕熱痰火結滯脈洪盛肢節煩疼

濕熱也 涼膈散見發熱 通聖散見中風 吐逆二便不通導氣清利湯

痰膈中焦氣聚上焦不下二陳見痰 加木通先服後吐 燒皂

角灰爲末粥清調服 皂角去皮弦琥珀各一錢麝少許神麴

爲丸作二次服用升提分利藥送下之立通少頃未通探吐之無不通者

○小便不通

點滴不出小腹脹痛由氣道閉塞

六淫七情痰濕血食內外諸邪皆能閉氣

氣分上

中下三焦上焦之氣肺主之肺熱則氣不下行治宜清降中焦

之氣脾胃主之濕盛或熱盛而氣滯不行須治濕熱若氣虛而

下陷不運須升清以降濁下焦之氣肝腎主之腎移熱于膀胱

無陰則陽無以化須純陰之劑滋腎丸肝脈過陰器肝火鬱不

伸則癰閉肝火疎泄則爲遺溺治取肝經俞穴又下焦脈在膀胱

眈經前肚經後出一咽中外廉口委陽膀胱經絡也下焦火盛

則癰閉虛則遺溺又督脈女子入繫廷孔男子循莖下至篡其

病癰閉遺溺治取督脈俞穴

不取膀胱俞穴者以膀胱但藏溺其出溺皆從三焦督脈及肝也

丹溪云肺熱不生水清金乃隔二之治也脾濕不運清不升

濁不降故肺氣壅閉不下行燥濕健脾乃隔三之治也若不關

脾肺但膀胱有熱直瀉膀胱乃正治也東垣分在氣在血以

渴不渴爲辨渴者熱在肺屬氣分用淡滲之藥茯苓薏苡澤瀉

琥珀燈心通草車前瞿麥扁蓄等氣薄之品氣薄爲陽中之陰

從陽而下降者也不渴者熱在下焦屬血分須用純陰之劑無

陰則陽無以化黃連黃柏知母滑石之類

淡滲之品乃陽中之陰非陰中之陰勿用

熱實者八正散親加木香腹痛不可忍木通湯上喘紅桃散

腎虛寒氣不化者甚而轉筋不救腎氣丸見虛此為下元冷

秘常用桂附乃通者 氣虛不化而不急滿惟倦怠懶言春

澤湯見傷

津液藏于膀胱氣化乃能出故用沉香橘紅之屬

或用吐法以提其氣氣升則水自降如滴水之器上竅開下竅

乃通也

氣虛而不升化用參芪等藥先服後吐之痰多閉氣用二陳先服後吐之更推類以盡其餘

或由

大便不通而小便漸閉者通大便則小便自行瘀血閉氣者宜

多用牛膝實者桃仁煎代抵當丸

見血牛膝膏

渴而腹冷水

氣也

水在腹中故冷停畜不運清氣不括黃瞿麥丸主之傾利升津液不生故渴不降故小便閉

腹溫為度

小便不通及轉胞危急諸藥不效用猪尿脬一個

底頭穿一小孔貫一通透翎管線扎緊翎筒口塞以蠟從膝口

吹氣滿七分線札緊再用手捻緊筒根令不洩氣乃去筒口

之蠟將筒口插入莖物竅內放手

旋開捻筒根之手也

却捻猪脬使氣透

入膀胱小便即出

小便不通嘔逆飲食不得入名關格若頭

汗出者

腸

死脈細濇者

知陰亦竭

亦死葱白一斤碎切入麝香五分

拌勻分二包先用一包置臍上以紅火熨斗熨之半炷香人換

一包以熨斗盛冷水熨之互相換熨以通為度

或臥水通老

葱煎湯服頃時探吐再服再吐以通為度

或身無汗以葱湯

入木桶內令病者坐桶上沒臍為度匝腰繫裙以覆之少時汗

出尿亦出即于桶中溺之勿出桶恐氣收而尿更阿也孕婦

胎滿逼臍臍胎轉翻傾側胞系了戾不得小便名轉胞須舉

其房令穩婆香油抹手入產戶托起其胎溺出如注次以人參

白朮陳皮升麻加入四物血見內煎服填時以指探吐如此三四

次則胎舉矣一法令孕婦臥榻上連榻倒豎起尿自出勝手托

男子亦有轉胞婦人轉胞不必盡由胎壓多因尿急膀胱而

驟馬馳車飛跑疾走致膀胱顛翻或水溢中焦食滯腸胃下壓膀

胱無處退避以致閃側翻轉熱攻氣迫者可推並須吐法滑石散

金匱婦人虛飲食如故在病不煩熱不得卧倚息喘也下不通則

得臥陽被迫此轉胞不得溺也此由虛寒氣不化溺腎氣丸即

澤被故熱此轉胞不得溺也急胞脹重墜翻轉腎氣丸八

以淋

一滴不出名閉即小便不通點滴而出名癰即淋二証皆由氣

閉滯其理已見上篇 淋証大概腎虛膀胱熱五藏六府所受

得入腎虛則火動常欲泄而不能藏火動欲泄則屬之肝故

數膀胱熱則水道枯澁故滲出澁滯數而且澇莖中痛淋瀝不

宣故謂之淋腎虛膀胱熱則水液少子和怡子人令頓食鹹魚

故澁也折無水脈實大宜分理脈虛細澁精血敗壞難治治法行滯氣

解邪熱通水道其大綱又在平心火此証最忌發汗淋証屬熱

汗則愈而無水汗之則尿血準繩謂暑月多此証以汗多小便

常赤澁也治用五苓散見傷鯁其外發之汗意謂內有白米桂

必不加滋陰更夜聚于內又從而導下之然有虛勢汗出而赤

淋者及津液枯燥又不宜滲利矣歟汗清熱滋液可也失血則
精畜同此論之 淋証羣中必痛若先痛後癢則火退矣或是
實証轉虛

氣淋初起為氣淋以氣滯而澀痛也白茯苓甘草稍白芷山梔
木通滑石澤瀉車前地膚子葱白生料五苓散見傷加阿膠

或五苓益元見傷各半服 火府母佐以導赤散見發熱石葦散

或四苓見傷加木通滑石瞿麥燈心小肺熱清肅之氣不下

降加味八正散 氣虛八物湯見虛損加杜牛膝黃芩

膏淋久為膏淋及砂石淋膏淋濕熱傷氣分水液渾濁如膏如

涕如米泔實熱八正散加蒼朮虛熱鹿角霜丸精尿俱出精塞尿道

欲出不海金沙散鬼絲子丸鹿茸丸見土牛膝地膚葉汁白茯苓澤瀉山梔甘草稍琥珀鬱金葶藶

砂淋尿為熱所煎熬成沙石如煮海水成鹽入正散神效琥珀

散如聖散石燕丸獨聖散石首魚腦中石十個煨滑石二錢

琥珀三分為細末每服一錢木通湯下螻蛄七個鹽一兩新

丸上鋪葶煨乾為細末每服一錢溫酒下冬葵子滑石瞿麥

琥珀土牛膝車前澤瀉山梔地膚葉汁必斷鹽乃效一則淡

食能滲利一則無鹽不作石也

血淋熱傷血分莖中必痛不痛為尿血見血門歸尾土牛膝赤芍玄胡車

前澤瀉鬱金山梔劉寄奴主之血瘀則小腹硬痛加紅花五

靈脂 血熱則色鮮紅脈數有力加生地 血虛六味見虛加

車前牛膝 血冷則色黯而枯尺脈沉遲腎氣見勞死血

牛膝膏 牛膝根莖葉酒煮服治小便不利莖中痛欲死及婦

人血結堅痛如神但虛人不宜用當同補藥用之免損胃 側

柏葉生藕節車前草等分搗汁調益元散見傷髮灰散小蘗子

飲並見立效散瞿麥散

痰淋痰鬱氣成熱所致七氣湯見青州白丸子風

勞淋勞則動火熱流膀胱所致 脾勞勞倦補中益氣見合五

苓見傷腎勞色傷陽虛腎氣湯陰虛知柏地黃湯並見心勞

清心蓮子飲見赤白濁

熱淋火府丹益元散見傷導赤散見發熱五淋散榆白皮散

冷淋由冷氣客于下焦滿于脬中水道為寒所凝不得宣通故

先寒戰而後便數成淋邪正相爭正氣怯邪氣之冷故寒進冷戰又為冷氣相激則鬱熱而成淋進冷

劑愈甚者是也宜地髓湯下八味丸見虛損或用生料鹿茸丸見血

附從蓉丸澤瀉散沉香散 若下元虛冷水寒冰凝小便不通

或淋瀝証見筋轉喘急欲死不問男女胎產急用八味丸料煎

服緩則不救蓋寒得熱則流通非附桂何能直達膀胱使雪消

春水來耶

又有似淋非淋者老人陰萎而思色則精不出而內敗火雖動

衰能遺小便澀如淋敗精流二便窒痛精傷血枯燥愈痛則精山外泄小便澀如淋人盡廢

愈便愈便則愈痛

精傷血敗氣亦下陷大便秘紅白似痢小便白濁如淋因其痛而欲便以求通因便多而氣

愈墜故痛更甚

大芎藭子丸

見咳

鹿茸丸

見腎氣丸

見虛損

又有胞痺一証小腹按之痛

水閉故按之痛

若沃以湯

水閉氣蒸成熱

小便不

利上為清涕由風寒濕三氣客于胞中痺而不通故氣不化風

寒由足太陽入太陽經絡腦下鼻故流清涕治以腎著湯

見傷

茯苓丸

見小便不禁

巴戟丸此本痺証而兼淋者也

○小便數

頻數無度似淋而莖中不痛故另分一類

以不痛故異多且不

滿又似不禁然可忍為異

証由腎虛有火火動欲出水不得藏

腎虛六味丸有火五

散數而少者伏苓琥珀湯利之免致澀痛成淋數而多者薯蕷

蓮肉益智仁之屬收之然此証固屬有火亦有下元虛冷腎不

攝水者兜絲子丸八味丸

見虛損

鹿茸丸

見血中

氣不足數而多補

中益氣湯

見氣

夜多小便益智仁二十個為末鹽五分水一盞煎

臨臥溫服或菟絲丸

小便畢少頃謂已盡忽再出些少或尿

後又急者多由忍尿行房所致

忍尿則水不下行行房則火炎氣升而不降水不下而氣不降

後雖便亦不暢其去未盡故清狀如此

宜生料五苓散

見傷濕

加阿膠吞加減八味

丸

見虛損

心移熱于小腸致小便數

大喜動心火多有之

分清散

七湯

見氣

仍以長砂妙香散

見心痛

煎吞小兒絲子丸

見赤白濁

大便

硬小便數者名脾約麻仁丸

見大便不通說詳傷寒陽明篇

天煖衣厚則氣

上并而外泄故多汗天寒衣薄則氣內斂而下降故多尿不在

初論

遺尿小便不禁

不知而出為遺知而不能忍為不禁此小便數為甚故另為一

類 多山肺腎虛寒氣不能攝補中益氣湯見送腎氣丸

大抵上虛補氣下虛固脫 睡著遺尿大菟絲子丸見咳 猪脬

炙碎煎湯下 韭子丸 六味丸見虛 去澤瀉加故紙四兩益

智仁人參各三兩肉桂一兩 老人尿不節山茱萸一味最妙

產後不禁血氣兼虛八珍湯見虛 已上皆虛虛寒之証亦

有熱甚神昏尿出不知者即傷寒論所謂直視失溲也此為死

証熱甚寒邪盛也失溲陰失守也故死 河間謂熱甚客于腎

部于手肝經死孔鬱結之極氣血不能宣通神無所用故遺尿

不禁肝主疏泄鬱結則泄愈甚後人又推廣之謂各藏府之熱皆能令小便

不禁皆熱証也實熱者神導水九見腫每服百丸空心白湯

下一服利即止後服

薛立齋治因勞發熱作渴小便自遺或時閉瀉肝血虛故

阻作肝火血虛陰挺不能約制午前服補中益氣湯見氣升故

山茱山藥年後服六味丸見虛損陰養血月餘悉退此虛熱也 有

洗手是尿即急不能忍者量房勞傷腎尿為火持不下得水則

陽得陰化故尿出乎艾豎腎冷不攝得水則益其冷而即出乎

然陰性遲火性急似當以前說為是大抵內水與外水相感施之理

小便黃赤

小便白則無火是黃赤乃有火也黃稍知母主之然有實火虛火之分如天熱多汗或陰分枯涸則小便短少短少則必黃此為虛火不得專用寒涼

○交腸

大小便易位而出也

糞出前竅尿出後竅

乃藏氣乖亂所致或因醉飽或

因大怒氣亂于中腸胃失職不循輪化之常道故也法當宜吐

以開提其氣

如走錯路者仍令回至原處則不再誤也

使關門清利得復司泌別之

職則愈矣吐後宜五苓散

見傷濕

木香調氣散

是中氣

各一錢加阿

膠末一錢湯調服或研黃連阿膠丸為末加木香少許湯送下

此皆除濕熱之劑蓋氣亂由于鬱不鬱則順道而行何亂之有惟鬱極暴伸勢必肆行橫決不循常道氣鬱則爲濕熱也嗜酒者血必瘀濕熱所傷也四物見加海金砂木香檳榔木通桃仁 姜宜人二便俱從前陰出以爲交腸用五苓喻嘉言曰非也交腸乃暴病驟然而氣飢于中此証乃久病以漸而血枯于內先由脾不攝血下行有若崩漏胞門子戶之血漸亾轉吸大腸之血亦盡又轉吸胃中之血亦盡下脫之血始無源而止血盡則氣孤而無偶爲拳爲塊奔追散亂水穀舍故趨新水道闕爲穀道江漢兩渠併歸一道與交腸易位而出不同安可用五苓再劫其陰其說甚辨錄之 夏子益奇疾方治婦人因產病交腸用舊燐頭燒灰酒服仍間服五

若散分利之如無幘頭舊紗帽可代以受頭氣日久取陽氣上

冲之義即月吐升提意故又治血崩取漆能行敗血也

關格

關格之說不一而各有理

經謂寸口

即手寸關尺之總名

主中

寸口本肺脈屬

藏以人迎在結喉旁乃胃脈屬府以候外

主外兩者相應大小齊等春夏人迎

微大秋冬寸口微大曰平人

說見四診

人迎一盛

大寸氣口一倍也下倣此病在

足少陽一盛而躁病在手少陽二盛病在足太陽三盛而躁病

在手太陽三盛病在足陽明三盛而躁病在手陽明四盛且大

且數

數即名曰溢陽

陽盛為外格也

得飲食寸口脈

一盛病在足

厥陰一盛而躁病在手厥陰二盛病在足少陰三盛而躁病在

手少陰三盛病在足太陰三盛而躁病在手太陰四盛且大且

數名曰溢陰為內關

不通

皆死不治人迎寸口俱盛四倍以上

命曰關格與之短期

按此皆以躁數為言是主熱立論乃舉隅之詞觀其又一條云必審按寒熱以驗藏

府之病可知此証有寒有熱矣

又謂五藏不和則七竅不通六府不

和則留結為癰故邪在府則陽脈不利不利則氣留而陽盛矣

氣大盛則陰脈不利

此二句當依難經云邪在藏則陰脈不利

對請今云陽大盛則陰不利有以見陰陽相不利則血留而陰

氣盛矣陰氣大盛陽氣不能榮也

血氣相和則榮茂今血不行而邪聚于陰經則陽氣不能

與故曰關陽

言閉關不通

陽氣大盛則陰氣不能榮也故曰格陰

拒格其陰不得入也陰陽俱盛不得相榮故曰關格不得盡期而死按

經言陰陽之邪偏盛或俱盛則其經脈不和而見於大迎寸口

如此後世獨診寸口故秦越人以上魚為溢陽被陰格脈從

外關內格得外陽為內陰所拒格不入尺為覆陰被陽格脈從尺

之為內關外格如破關開也仲景則謂寸口脈浮而大浮為

虛正氣內虛大為實邪氣在尺為關在寸為格關則不得小便

格則吐逆此與越人同意越人以脈之長而有餘言皆邪盛也又謂下微本

大者下謂沉分本謂尺言沉則為關格不通不得尿沉而微小

與邪盛虛無陽則不化故小頭無汗者可治有汗者死也

又謂扶陽脈伏而牆伏則不化行積則伏則吐逆水穀不化

滿則食不得入胃名曰關格不化以尺寸言此以跌陽言

也詳此後賢所論各有其理亦推廣內經未盡之意也 又雲

岐子云關格者陽易位蓋陽上陰下定位也今寒反在胸中
者有白而水漿不下熱在丹田而小便不通治關格上寒治
以熱下熱治以寒若皆兼有寒熱分主客治之治主宜緩治客
宜急此亦一說也由此論之則夫陽極于上陰極于下否隔不
交者當通其陰陽轉否爲泰可知矣 又張景岳謂內經謂人
迎盛四倍以上爲有陽無陰寸口盛四倍以上爲有陰無陽二
者俱盛四倍以上爲陽極于上下焦無陽陰極于下上焦無陰
陰陽離絕多由酒色傷其精氣以致陽飛于上陰走于下脈浮
豁無根散大躁動如此爲欲脫危候凡見六脈如弦如革洪大

與常而且躁數脈動則身亦動乳下之虛里乃膈旁皆有動氣
春春築築與脈相應上氣微喘動作則甚肢體無力謂爲虛損
則本無欬嗽失血等証謂爲痰火則又無實邪發熱等証此真
陰敗竭元海無根最危之候也彼不納食不得小便自有本証
與關格何涉哉其說雖與前人異然理甚精按諸家皆就止食
一定之脈景岳則指定大數之脈言而無
無吐食不瀉之証各如其說施治可也

○頭痛

頭爲清陽之分外而六淫之邪氣相侵內而外府經脈之邪氣
上逆皆能亂其清氣相搏擊致痛須分內外處實貴者其人血
氣本不虛爲外邪所犯或蔽覆其清明或壅塞其經絡或內之

實火止炎因而血瘀凝滯不得通行而痛其痛必甚此爲實虛

者其人氣血本虛爲外邪所犯或內之濁陰上于雖亦血瘀凝

滯不能通行而搏擊無力其痛不甚此爲虛

準繩謂其氣虛寒遇外之寒濕所侵

血虛脈寒卷縮緊急引其小指而痛伸緩則痛止實者邪氣實而正氣不虛可任攻虛

者正氣自虛而邪氣自實補正仍須治邪若邪亦不實但補正

則邪自退六淫外邪惟風寒濕三者最能鬱遏陽氣火暑燥

三者皆屬熱受其熱則汗泄非有風寒濕襲之不爲患也然熱

甚亦氣壅脈滿而爲痛矣內邪不一皆統于風

風即氣之飄騖土升者

以高巔之上降風可到也故不論內外邪湯劑中必加風藥以

土引之風藥味之薄者陰中之陽自地升天者也升麻薄荷之

類痛如破不能忍蔓荊子風在太陽巔頂連頸強痛脈浮緊君

羌活加羌葱

葱白宜連鬚用

風在少陽頭角痛口苦脈弦細君柴胡加

羌葱風在陽明額痛連目脈浮長君白芷加羌葱少陰太陰脈

至胸頸而還故無頭痛惟厥陰脈會巔頂故巔痛君晉本如脈

沉足冷乾嘔吐沫加吳茱萸附子

用風藥者由風木虛不能

升散土寡于畏得以壅塞而痛

猶言少陽升氣不清脾濕上壅不降耳

故用風藥

以散之若疎散太過服風藥反甚

發散太過清陽之氣愈虛濁陰終不降且表虛易招外侮

宜補氣實表順氣和中湯

凡外感頭痛詳傷寒論

頭痛久

不愈者名頭風

頭風頭面多汗惡風時止時發先風一日則

痛甚至風口則少愈

清陽之氣被鬱故喜通而惡塞風者天氣之通者也先鬱後通先風一日正鬱極欲

通之候也欲通不通故擾動而痛甚至風由內有鬱熱或痰火日則天氣通而人氣應之逆通故少愈也

毛髮常疎風易入外寒束內熱閉逆為痛醫用辛溫之藥散其

標寒雖暫效以熱濟熱病益深宜瀉火涼血佐以辛散用星蒼

耳子石菖蒲天麻最當 頭風久不愈恐損且邪毒清空膏主

之有痰加半夏諸般頭痛並治惟血虛頭痛詳下不宜正巔頂痛

者亦勿用 內傷頭痛氣虛者耳鳴目眩精氣不升九竅不利

氣不能達白覺空虛惡勞動動則痛更甚脈虛大必包裹其頭

乃少寧四君子湯見氣加風藥 血虛頭痛魚尾眉尖後終日星

星如細筋抽引痛不甚脈芤或數善驚惕當歸川芎連翹熟地

各二錢水煎泡薄荷末二錢鼻吸其氣候溫服安臥效或四物

湯見血加風藥

氣血俱虛者調中益氣湯

見勞倦

加川芎蔓荊子

細辛神效

陰虛發熱兩太陽穴作痛此相火自下冲上六味

丸見虛損

產後血瘀頭痛膈熱上干也

熱厥頭痛雖嚴寒猶

喜風寒在煖處或見烟火尤甚宜清上瀉火湯後用補氣湯

頭目赤腫胸膈煩悶大便微秘身半已下寒足筋尤甚

此條詳寒熱篇

上熱下寒

既濟解毒湯

見寒熱

痰厥頭痛暈眩煩亂惡心欲吐半

夏白木天麻湯

見眩暈

虛風內作非天麻不治痰非半夏不除黃

芪實表止自汗人參補氣二朮澤瀉茯苓除濕橘皮調中升陽

炒麴麥芽消食蕩胃乾羌除寒黃柏

酒炒

治伏火發躁

濕熱作

痛必昏重欲吐兼眉稜骨痛二陳

見痰

加風藥

傷食頭痛胸膈

痞塞噯酸噫敗卵臭惡食治中湯加砂仁一錢或紅丸子或平

胃散

並見傷飲食

加枳實傷酒頭痛惡心昏冒眩暈葛花解酲湯

見傷

餘食

頭痛顛疾下虛上實也

寒濕上干

過在足少陰太陽甚則入腎

寒濕自經而入藏也腎主骨髓髓通腦寒入骨髓逆上至腦阻

碍清陽故腦痛連齒齒亦骨之餘也

此幾幾乎真頭痛矣

濕熱上干者

必以苦吐之輕者透頂散搐鼻取涎

頭重如裹由濕氣在頭

頭者輕清象天清故輕也濕者地之濁氣濁故重也外濕蒙蔽

故如裹宜微汗勿大汗恐汗去濕留紅豆搐鼻散 外有嗅毒

頭痛吃炒香附一味愈

真頭痛手足寒至節全腦連齒皆痛

但發及死不治與無錫丹

見呢

灸百會猛進參況烏附或可生

然天柱折者必死

真頭痛與真心痛皆寒証陰滅陽也

偏頭痛舊分右屬熱與痰

熱用黃芩痰用半夏蒼木

以陽明胃府居右多熱

多痰也分左屬風屬血虛以肝木主風居左又左屬血也

風用荆芥

薄荷血虛用川芎然不必泥定

生蘿蔔汁仰臥法鼻中左痛注

右通故可注從右透左則並通矣

右痛注左葶撥散緒胆

熱搐鼻川芎散細辛散川芎柴胡為主佐以蔓荊子蒼

耳葉升麻甘草葱羌大便秘大黃下之外用草薢子五錢大棗

十五枚搗成泥塗綿紙上箸捲成筒去箸納鼻中良久下涕痛

止又石膏二錢牛旁子二錢為末酒下飲大醉立愈

雷頭風頭痛而起核塊或頭中如雷鳴

風動作聲如籟之發

清震湯或不

省人事地膚子生羌搗爛熱酒冲服取汗愈子和用茶調散

見傷飲食吐之後用神芎丸見腫下之再服烏荊丸見血及愈風餅子

之類弱者用涼膈散見發熱消風散熱痰熱生風作响半夏見牙

羌汁煮過一兩大黃酒浸透濕紙包煨曰羌蚕連翹橘紅桔梗天麻各五

錢片芩酒炒七錢薄荷葉錢三白芷青礞石粉草各一錢爲末水浸蒸餅

丸菴豆大臨臥茶吞二錢以痰利爲度後服清痰降火之藥

氣挾肝火作响加味道遙遙見鬱最當亦有如聾响者名天白蟻茶

子爲細末吹鼻

太頭痛頭腫如斗俗云大頭瘟天行疫氣所發頭面赤腫或發

疙瘩先發鼻額屬陽明先發耳前後屬少陽先發脰後及頂屬

太陽若三陽俱受邪則各處併發治戒急下恐遺高邪當先緩後

急退熱等連消毒連翹鼠粘子緩緩治之細口啣或食後服或酒炒使上升不速下

皆緩之義候大便熱結上焦之邪熱皆降聚于中州乃下之三承氣

見大便不通選用此毒若結塊不散必成膿外用栢葉和蚯蚓糞泥

搗敷或井底泥調大黃芒硝末亦可 赤腫結核排針出血愈

頭眩掉眩屬風熱風火主動也羌活川芎白芷藁本蒼朮細辛

甘草天麻若因肝腎二經血虧致火炎生風須養血又凡人內

有痛則頭搖心絕則頭搖狀如烟煤直視者死瘕病亦頭搖

頭風屑羅謙甫謂肝風盛金來尅之使頭有雪皮難解大抵風熱上蒸其液

乾則化為白屑耳大便實瀉清丸見中虛者人參消風散

昏局 卷之三 頭痛 眩暈 三

肩稜骨痛或外邪鬱成風熱上攻于腦從目系過眉骨下注于

目目系上屬于腦過眉骨也或內之風熱濕痰上攻選奇湯主之風熱者清

陳加酒芩白芷肝虛者纔見光明眼眶骨痛生熟地黃丸肝血

風寒羌烏散也肝經停飲發則眉骨痛眼不可開晝靜夜劇濕為陰邪導痰

湯痰見或小芎辛湯加半夏橘紅南星茯苓

○眩暈

眩惑亂也從目從玄玄黑暗也謂眼見黑暗也人久踣陡起

暈與運同旋轉也所見之物皆旋轉如飛世謂之頭旋是也此

風火上冲使然經以棹眩屬風木風即火氣之飄忽者風從火

生火藉風煽觀能得風而旋轉可見矣外風內風熱風經言

五藏六府之精氣皆上注于目然則目之能視者乃藏府之精氣靈明爲之也此上注之精氣必安靜不搖而後燭物有定若爲風火所煽而旋轉則所見之物亦旋轉矣此乃目之精氣爲病非目睛之轉動也然經謂目系屬于腦出項中邪邪指風邪言中項入深隨日系人腦則腦轉腦轉則引日系急日系急則目轉眩眊以德謂順靜益諡若水之化動擾撓亂者火之用頭以腦爲主腦者髓之海目之童子亦腎之精二者皆屬腎水喜寧靜而惡動擾寧靜則清明內持動擾則散亂昏惑故曰眩腦轉云云則風火煽動固有腦轉系急而目轉眩者乎六淫七情飲食戾水諸邪皆能動火生風風火盛極卽然雖壯實人亦有之

不必虛弱也但虛者多耳昧者定歸之虛試觀醉人眼花與虛
何涉哉 劉宗厚以為上實經以為上虛非相悖也蓋虛者血
與氣也實者風火與痰涎也正自虛而邪自實也 痰涎隨風
火上壅濁陰干於清陽也故頭風眩暈者多痰涎丹溪謂無痰
不作眩必搐去而後愈

治法

氣虛者補中益氣湯見 血虛者補肝養榮湯或四物湯見加
荊芥穗 腎陽虛八味丸見虛 或黑錫丹見逆腎陰虛六味
丸見虛 中腕伏痰嘔逆旋覆花湯 痰閉不出者吐之獨聖
散見傷吐見食吐見可用清上辛涼之藥防風通聖散見并加半夏等

青黛散搐鼻取涎神效 痰涎盛而大小便結利下之但見

有吐涎者知其有痰牛黃橘紅旋覆等風痰南星羌秦 因停

水眩暈者詳水腫門 因濕者頭重不起虛人更甚五苓散傷

濕除濕湯見中 因熱者煩渴梔子黃連甘菊實者大黃酒炒

三次爲末茶調每一二錢 因氣鬱者則志氣不舒逍遙散見

加薄荷菊花 虛寒者宜三五七散或芎附湯見 生料正元飲

加鹿茸一錢下靈砂丹見 嘔或正元飲加炒川椒十五粒下茸

珠丸不效則獨用鹿茸一味每服五錢無灰酒煎入麝香少許

服緣鹿茸生于頭 瀉多脫陰虛陽上浮時時眩暈或視物不見

者危 眩暈非天麻不治不可缺

○項強痛

多由風寒邪客三陽亦有痰滯濕停血虛閃挫久坐失枕所致

感冒風寒者驅邪湯 痰盛者消風豁痰湯 濕盛者加味

勝濕湯

血虛火盛筋燥者

項強急動則微痛左為眩而暈

疎風滋血湯

閃挫久坐失枕而致項強不可轉移多由腎虛不能生肝肝血

虛無以養筋六味丸

見虛損

常服更妙

○胸痛

缺盆下曰胸

當與痞滿門胸痺條參看

五藏及胆心包絡七經筋脈俱至胸是諸經之邪皆得為胸痛而胸者肺之部分則其痛尤多屬肺可知乃醫書多以肝病為言此舉隅之論耳勿泥須知胸為清陽之分其病也氣滯為多

實亦滯氣滯則痰飲亦停宜行氣除飲此治在肺分肺主氣宜

下降不宜上壅者也至氣有餘為火而屬心痰本于濕而屬脾其義可兼舉矣若乃肝氣實

而上冲因載血以上或肝虛而清陽不升濁陰不降此則病在

肝胆痛必連脇矣至肝火之上炎由腎水之竭肝氣之虛寒由腎火之衰亦可推治法於上下

篇參之經云春脈如弦其氣不實而微此謂不及令人胸痛

引背兩脇脹滿此肝虛也補肝湯見脇痛金匱肝中寒者此下

臂不舉舌本燥七字醫宗金匱謂是衍文刪之善太息胸中痛不得轉側則脇亦痛可知食則

吐肝性條達為寒所鬱不得伸故太息以舒之食則吐者氣上逆也而汗出也又云肝着氣着

也常欲蹈其胸蹈者按摩之謂先未苦時但欲飲熱寒則塞滯熱則流通非喜飲熱旋

覆花湯主之方用旋覆花三兩葱十四莖新絲少許水三升煮一升頓服金鑑謂與証不合疑誤愚謂此乃停飲

寄扁
示之三胸痛心痛
三

而陽氣不宜故用此逐此肝實也素問曰陽明所謂胸痛短

飲陽通加絳以和血也氣者水氣在藏府也輕者五苓散見傷濕重者用張子和法取之

木香鬱金二味氣鬱痛者倍木香血鬱痛者倍鬱金爲末每

服二錢老酒下虛者加人參痰飲痛輕者小陷胸湯重者大

陷胸丸治之若痰唾稠粘者則用控涎丹見痰飲甚合

心痛心包絡痛胃脘痛

心爲君主義不受邪若邪傷其藏而痛者謂之真心痛其証卒然大痛咬牙噤口舌青氣冷汗出不休面黑手足青過節冷如冰且發夕死夕發且死不治不忍坐視用猪心煎取湯人麻黃肉桂乾姜附子服之以散其寒或可死中求生如但見爬床搔

靜而無青色四支不厥聲尙能出卽非真心痛乃心包絡受邪作痛也而包絡之邪皆由各藏府經脈傳來如從胸痛至心是肺心痛從胃脘痛至心是胃心痛從脇痛至心是肝心痛從腰痛至心是腎心痛可類推之蓋五藏六府任督各支脈皆絡于心其邪氣自支脈而乘心者不易入于心而但犯其包絡也于是氣血爲邪所滯邪正相擊故痛矣

心包絡痛在胸下膻中處稍下卽爲胃脘痛胃上脘名賁門在臍上五寸去膻中三寸而痛每相連故世俗總以心痛呼之且有九種心痛之說曰蟲飲食風冷熱悸疰去來痛丹溪云心脇痛須分新久若明知身受寒氣口食寒物于新得之時當

與溫散或溫利之仲景九痛九潔病久則鬱蒸成熱若用溫散

溫利恐助火須加山梔仁氣鬱即痛不必待成熱也而槩以

火鬱言之者以氣屬陽即屬火也此義宜知寒痛寒氣客于

腸胃卒然而痛二陳見痰飲草果乾羌吳茱萸扶陽助胃湯草薤

薤丸之類熱痛清中湯黃連龍胆草之屬痰積痛星半安

中湯海蛤丸或吐之痰痛濕痰嘈雜不寧如飢如飽欲吐吐

即寬二陳加草薤蒼朮清痰流飲漉漉有聲攻走腰肋胃苓

湯見泄瀉寒痰一月一發或兩發或二三月一發發時痛極悶

死偶經或勞乘勢湧起平胃見傷飲食加乾羌草薤枳壳咳逆上

氣痰飲心痛海蛤粉煨瓜萸實等分末米糊丸氣攻刺

作痛加味七氣湯沉香降氣散此及下方正氣天香散但忍氣

是死血作痛脈必澁發作時飲米湯下或作呃有時氣逆騰

如蟲攪唧唧有聲勿誤作蟲壯人用桃仁承氣湯見弱人用歸

尾川芎丹皮紅花蘇木玄胡索桂心桃仁泥赤麴番降香通草

川山甲之屬煎成入重便非汁大劑飲之或失笑散蟲痛如

咬面有白斑又面色乍青乍白乍赤唇紅吐清水或青黃水時

痛時吐能食或食即痛以蟲得食而動故痛也飽後痛即止化

蟲丸見川練子苦練根使君子檳榔黃連雷丸烏梅不可用花

椒太辣惡大驚跳治許蠱門食痛如有物碍纍纍不下時喚

腐氣畧傷食悶悶作痛平胃散見傷加枳實半夏檳榔舊有

酒食痰積一遇觸犯便痛挾風寒者參蘇飲

見發熱

加葱薤挾怒

氣者二陳

見

加青皮山梔麴蘖山查草果挾火熱者二陳加枳

實黃連

卷計炒

山梔

脈堅實不大便心下滿痛不可按者實也

大柴胡

見

三承氣

見大便不通

下之

痛不可按爲實可按爲虛虛

者補而行之或純補

丹溪治許文懿公食積痰飲往來如潮

湧上則爲心脾痛降下則爲膈痛以製甘遂末入猪腰內煨食

之

卽張子和煨腎散方峻勿輕用

連泄七次足便能步然多年鬱結一旦泄之

徒引動其猖獗之勢仍以吐劑達其土焦連用瓜蒂黎蘆苦參

等俱吐不遇仍用附子尖三枚和漿水以蜜飲之方大吐膠痰

一桶然後治及中下二焦以朴硝滑石黃芩石膏連翹等一斤

瀉煎冷飲之四日服四斤腹微痛二便秘脈歇至于卯酉時乃

陽明之應胃與大腸積滯未盡也乃作紫雪見遺精論末三日服至

五兩腹稍安後又小便閉痛飲以蘿蔔汁得吐立通又小腹滿

痛以大黃牽牛等分水九服至三百九下如爛魚腸者二升許

脈不歇又大便併痛與前九下穢物如柏油條尺許自病至安

脈皆平常弦大次年行倒倉法見積聚全愈此得于張子和無胆識者敢乎

○腹痛小腹痛

經脈有正行別其別分絡藏府部位邪在正經則注於別絡而

從藏府所虛之部位而入焉胸為心肺部位肚腹脾肺部位胠脇小腹肝胆部位腰脊腎部位也

邪入則氣停聚瘀血不行脈絡皆滿邪正相搏故痛六淫七

情飲食勞傷皆能致之不獨寒也 痛脈多緊急河間謂急脈

固屬寒象然寒脈當短小而遲若兼洪數則爲熱痛之脈 分

寒熱虛實氣血飲食痰蟲施治 寒痛綿綿無增減喜熱惡寒

口中和二便清利脈沉遲乾羌肉桂吳萸草蔻木香厚朴陳皮

香附之屬 諸寒痛得熱卽止者用熟艾半斤隔白紙鋪腹中

又以葱蔥數枝批作兩半片鋪艾上再用紙蓋之慢火熨斗熨

之冷則易臂腹中熱腹皮熱難當仍用帛裹緊將冷乃解一法

用炒鹽熨 房事後受寒腹痛灸神闕氣海等穴或炒羌蔥熨

之內服理中見中寒四逆見厥等湯 熱痛時痛時止口乾舌燥二

便結澀喜冷惡熱脈洪數白芍黃芩黃連山梔甘草之屬 寒

亦有實熱亦有虛熱實者寒藥下之三承氣等寒實者熱藥下之急

九辨虛實法不一而可按屬虛拒按屬實尤其顯著者治虛

分血血痛時常覺虛豁似飢非飢呼吸無力氣虛也六君子見

加木香若假作作痛似細筋抽引不寧又如芒刺牽引屬血虛

四物見血加陳皮甘草木香氣滯作痛則腹脹脈沉木香順氣散

七氣湯見此為氣實又飲食痰濕死血蟲作痛皆為實食

痛欲大便便後痛減脈沉滑或弦食得寒則凝得熱則行平胃

散見傷食加枳實草薤半夏保和丸枳朮丸二凡並見之屬酒

積痛三稜蓬朮香附蒼朮陳皮厚朴茯苓木香檳榔丸主之多

年敗用蜆壳煨存性加三倍于木香檳榔丸中更加山梔茴陳

其效甚速 痰痛脈必滑眩暈吐涎或下白積或小便不利痰

氣道也或得車辣熱湯則暫止二陳見痰飲加蒼木香附撫芎枳實

菴汁 死血作痛脈必澹痛有定處元胡歸尾五靈脂蘇木桃

仁沒藥赤芍等或桃仁承氣湯見血虛者加歸地蜜丸服以緩除

之 蟲痛心腹懊懣往來上下痛有休止或腹中塊起惡心吐

清水食厚味或飽即止面色青白赤不定虵蟲咬面必黃參看

心痛雞汁吞萬應丸見蟲雄黃白礬飯丸亦可 感濕而痛小便

不利大便澹泄脈必細胃苓湯見泄瀉感暑而痛吐利併作脈

必虛藟十味香茹斂六和湯並見傷暑詳霍亂門 失笑散見心痛治

心腹痛神效劉寄奴末六錢玄胡索末四錢菴汁熱酒調服亦

惟腎通雄氣血之齊也。中脘痛太陰也。理中寒。延中。見勞

之類。臍腹痛少陰也。四逆。見真武之類。景東陽謂心脾筋結

以屬脾胃其腎之筋脈從腰貫脊並不及臍當臍痛用腎經藥

太誤愚謂腎附于脊正與腎對又胎胞初起中起一莖形如蓮

花一莖即臍帶蓮莖即腎是臍乃腎之根蒂而位又正對小

則當臍痛雖與少陰經無涉而謂與腎藏無關亦不可也。小

腹痛厥陰也。重則正陽散田陽丹之類。輕則當歸四逆湯。見之

類。小腹痛因小便不利者五苓散。見傷。若小便利者審是血

証。桃仁承氣。見血之類。若肝氣鬱痛者青皮柴胡之屬亦以可按

為虛拒按為實。氣寒血結威靈散氣滯血凝當歸散若連陰

作痛按之即止為肝經血虛四物。見血。加牛膝人參炙草又白膠

香一味最妙。其有青筋見于小腹及大腹乃肝火乘脾小柴胡

見寒熱 合四物加胆草山梔 若因罌丸腫疼牽引而痛乃疝氣
病也霍亂腹痛必吐利兼作亦有不吐利者名乾霍亂又腸癰
腹痛小腹痛並小便數似淋身甲錯腹皮急按之軟如腫狀或
遶臍生瘡可辨也 又有胞痺一証小便不利小腹按之痛若
沃以湯詳痺及淋二門

○腰痛

膀胱脈抵腰腎脈入腰又經曰腰者腎之府也轉搖不能腎將
憊矣是腰痛乃腎與膀胱之病也太陽經虛則風寒濕諸客邪
皆得爲患而腎虛之所患尤多腰肢痿弱小體疲倦胛膝酸軟
脈或洪細細皆無力痛亦悠悠隱隱不甚是其候也分寒熱二

証脈細無力氣怯弱小便清利為陽虛宜腎氣丸見氣標香丸

生料鹿茸丸見血之類仍以茴香炒砂猪腰切片勿令斷縹末其

內紙裏煨熟黃酒下脈洪而無力小便黃赤虛火時炎為陰虛

東垣所謂醉以人房損其真陰則腎氣熱熱則腰脊痛不能舉

久則髓減骨枯發為骨痿六味丸見虛損滋腎丸見小便不通封髓丹

見遺精之類 瘧痢後月經後痛者多屬虛于補氣血藥加杜仲

側柏葉 丹溪云凡腰痛必用官桂開之痛方止脇腹痛亦然

有風有寒有濕有熱有閃挫有瘀血有滯氣有痰積 傷于

風脈必浮或左或右痛無常處牽引兩足者防秦艽必用 感

寒而痛腰間冷如冰脈必緊得熱則減得寒則增者附湯見中寒

加辣桂杜仲外用摩腰膏 傷于濕如坐水中脈必緩遇天陰

或久坐久坐則濕凝必發身體腫滲濕湯腎着湯並見傷濕體重腰冷飲

食如故小便自利名腎著寒濕之氣凝着不行治宜除濕兼溫散 風濕

獨活寄生湯 濕熱蒼朮湯獨活湯羌活湯 閃挫或跌撲損

傷而痛乳香趁痛散五積散見中加桃仁大黃蘇木各一錢倍

當歸或以茴香根同紅麴搗爛熱酒調服若因勞役負重而痛

和氣飲見腫脹或普賢正氣散 瘀血脈必濇轉側若刀錐之刺

大便黑日輕夜重桃仁酒調黑神散或四物並見血加桃仁紅花

之屬 氣滯脈必沉烏藥順氣散見中人參順氣散 痰注脈

必滑或沉弦二陳見痰加南星香附烏藥枳壳威靈仙治痛要藥

爲末每用五錢酒內煑乾酒下微利爲度杜仲

絲黑正破故紙桃仁炒去皮尖玄胡索等分爲末酒煮麴糊胡桃肉

和丸桐子大空心溫酒或白湯下五七十九宜下者用之腰

痛雖屬腎與膀胱然有子病累母者故鬱怒傷肝故致腰痛宜

調肝散有土病及水者故憂思傷脾亦爲腰痛沉香降氣湯見

和調氣散見中腰痛面忽紅忽黑爲心腎交爭難治之証也

○背脊強痛

督脈主脊經云督脈之別名曰長強別走太陽實則脊強取之

所別也刺灸之類大腸筋挾脊心脈與脊裏細筋相連貫故心

痛有連背者脾筋着脊腎筋脈貫脊脊髓空則痛膀胱

筋脈挾脊上項爲風寒濕所襲則倔強不能屈伸取本經膈中
血絡 背上兩角爲肩解小腸脈出之肩解下成片肉爲肩胛
大小腸筋脈俱繞之又肩胛屬肺部分支太陽中風濕經脈不
行脊痛項強不可回顧羌活勝濕湯見傷濕兼氣實鬱滯者則常
常作痛加木香附氣虛鬱滯者則時止時痛加升柴參芪血虛
鬱痛者則夜甚時止加歸芍血瘀鬱痛者則夜痛不止加羌黃
靈脂紅化風盛項背強加威靈仙濕盛肩背重加二朮痰氣凝
滯則嘔眩本湯送青州白丸子見中風看書對奕久坐而脊背
痛者補中益氣湯氣見虛損或八珍見虛損加黃芪 喘咳氣逆肩背痛
汗出肺實也熱也肺虛亦痛覺寒少氣不足以息當補氣 腎

氣上逆先背痛後及肩和氣飲見腫加炒鹽小茴當肩背一

片冷痛而用神保九者見傷飲食此有積氣故也素虛人或病後

或發汗過多心膈間痛引乳脇或肩背此氣上逆當引使歸元

有患肩胛縫一線痛起上跨肩肩背屬小腸經至胸前側脇止胆經晝

夜不息丹溪謂因思慮傷心心火虛移于小腸及慮不能決又

歸之胆胆火動子來乘母為實邪以人參四錢思慮則氣結不行故補其氣以行之

本通二錢引火從煎湯下龍薈丸見脇肋痛而愈

○脇肋痛腋下為脇肋下為脇脇下為助助下為季脇季脇下為眇

肝胆脈布脇而心包絡筋脈亦挾脇肝脈布肋而脾筋亦結肋

胆筋脈乘季脇而肺筋亦抵季脇胆脈乘眇是脇肋痛者必盡

由肝胆而肝胆爲多 大概分氣血食痰四種而怒氣瘀血居

多治者須分左右審虛實左痛多留血或肋下有塊右痛多氣

鬱氣鬱則痰亦停然左血右氣亦難泥定大抵瘀血按之痛不

按亦痛痛無時息而不膨脹氣痛則時止而膨得嘔卽寬以此

辨之 脇痛火實者忌陳皮生羌細辛能令肝脹

味又辛散火得風而益熾也故忌之龍薈丸柴胡青皮必用 肝火鬱甚用黃連

龍胆草等苦寒直折火愈鬱愈烈用大瓜蒌一枚連皮搗爛加

粉草二錢妙瓜蒌汁寒潤滑於鬱不逆又如油之洗物未嘗不

潔也詳準繩 氣實痛枳壳青皮羌黃香附甘草有痰加蒼朮

半夏白芥子枳壳乃治脇痛的劑必用 死血阻滯必日輕夜

重午後發熱脈短瀆桃仁承氣湯見加繁甲青皮芎歸之屬

痰飲痛脈沉弦滑導痰湯見痰食痛凡痛有一條扛起者是也

煮黃丸見必治脇下痙痛如神悲哀傷肝氣引兩脇疼

痛枳壳煮散房勞傷腎氣虛血滯胸脇多有隱隱作痛宜補

腎加芎歸之類和血酒色太過脇下一點痛不止名乾脇痛

甚危惟大補氣血而已虛冷作痛不宜疎散須辛熱補劑

肝虛視物不明筋脈拘急面青爪甲枯脇引小腹痛補肝湯

凡痛而脇骨偏舉者肝偏傾也

○臂痛肢腫

臂痛有六道經絡究其痛在何經以行本經藥行其氣血氣血

通則愈矣 以兩手伸直臂貼身垂下大指居前小指居後而

定之其臂臑之前廉痛者屬陽明經以升麻白芷乾葛行之後

廉痛者屬太陽經以藁朮羌活行之外廉痛者屬少陽經以柴

胡行之內廉痛者屬厥陰經以柴胡青皮行之內前廉痛者屬

太陰經以升麻白芷葱白行之內後廉痛者屬少陰經以細辛

獨活行之并用針灸法 臂爲風寒濕所搏或飲液流入或因

提挈重物致痛或腫或不腫除飲証外其餘並可五積散見中

及烏藥順氣散見中或蠲痺湯見中審知是濕蠲痺湯每服加蒼

朮末三匙防已四分挈重傷筋者琥珀散劫勞散或和氣飲見

脹 每服加白朮黃五分以羌黃能入臂故也薄桂味淡能橫行

手臂引藥至痛處

亦不痰飲臂酸疼軟麻導痰湯見加不香白薤黃各五分重者

控涎丹見痰加去油木驚子一兩桂枝五錢每服二十丸加至三

十九 血虛不榮于筋者蠲痺湯四物湯見各半貼煎服 氣

血凝滯者舒經湯

腋屬心包經肝經 腋前屬肺經 腋後屬心經 腋下屬肝

經 經氣熱則腋腫察其部位治之

○身體痛身體拘急

體痛謂一身盡痛傷寒太陽表証六脈俱緊發汗陰毒傷寒陰

被霍亂吐瀉中胃汗太多濕痺濕流關節一身盡痛風濕虛勞

氣血虛損脈皆有之寒者甘草附子湯 熱者當歸拈痛湯

內傷勞傷飲食兼感風濕者補中益氣湯

見氣

加羌黃升麻蒼

朮藥本治之

春月寒濕鬱遏升陽不得升火伏下焦浮而躁

熱雖在陰室中亦汗出壯火食氣困乏懶言以麻黃復煎湯漸

漸發之令寒濕去陽氣升困倦乃退

徧身痛如勞証者參芪

甘草附子

炮

羌活木香知母芍藥川芎前胡枳殼枳梗白木當

歸茯苓半夏

製

各五錢柴胡驚風

醋

各一兩桂心酸棗仁各三

錢杏仁

炒

五錢爲末每服四錢羌三片棗二個烏梅三個葱白

三寸水煎空心調服少年虛損冷憊老人諸疾並治惟傷寒體

痛不宜活血丹與四物蒼朮各半湯相表裏治徧身骨節疼

痛如神身體拘急屬寒寒則收引也又屬濕濕亦寒也寒屬

腎濕屬脾于二經取之

○面詳四診察面○頰車蹉

諸陽經皆上至於頭而胃脈起鼻交頰中俠口環唇循頰車上

耳前過客主人故面部屬胃經

按小腸脈別支從頰上胃熱則

面熱便躁結者先用調胃承氣湯

見大便不通

徹其本次用升麻加

黃連湯以去其經絡中上行之風熱胃寒則面寒先以附子理

中丸

見中寒

溫其中氣次以升麻加附子湯以散其經絡中上行

之寒

風熱甚則面腫痛白芷升麻葛根薄荷防風荆芥羌活

蒼木黃芩石膏外杵杏仁膏塗之腫如蛇狀青苔水調塗風

水亦浮腫詳腫脹門

腫與浮異風火上炎紅腫而痛此邪有餘而腫也脾肺氣虛不能運行上壅不降面

目虛浮此正不足而浮也

面瘡或粉刺或起白皮作瘡但淺在皮膚者皆

屬肺經風熱清肺飲

面焦胃脈衰人參黃芪甘草白芍升麻葛根白芷

面塵

即晦暗

陽氣鬱滯則無光水涸則不潤故晦暗如蒙塵土宜疎肝清肺

滋腎

面上黧黑斑水虛也女人最多六味丸

見虛損

外用甘松

山奈細辛白芷白藜白芨防風荆芥羌活桑本大麻羌活陀僧

川椒菊花獨活枯礬檀香各一錢棗肉七個肥皂肉一斤同爲

丸秋冬加生薑五錢皮粗稿加牛骨髓三錢洗面

面上黑子

石灰醃水調糊糯米插入灰內留半截在外片時米色如水晶

用以點之卽落

疔腮鷄子青調赤小豆末加蝸牛飛麵搗勻

貼之又用靛缸底泥塗之即消

面黑有胃陽虛腎寒侮土故

黑色見於面唇

唇者皮之華土不勝水故黑

以升麻葛根防風白芷推陽胃

氣而散其滯蒼朮散其寒白芍以斂脾陰參芪甘草羌耆以補其陽午前陽升之時服之數貼而愈又有登廁感非常臭氣而得者以沉檀焚于帳內薰之旬日而愈蓋臭屬腎水香屬脾土取其相勝也又有因吃斑鳩而得者鳩常食半夏苗有毒以羌汁解之而愈

欠伸頻重蹉口開不能合醉以酒候睡皂角末吹其鼻嚏即止

○耳

經謂腎開竅于耳又謂心開竅于耳○解者謂心本開竅于舌因

舌無竅故借竅于耳。肺絡會于耳。胆三焦脈皆走耳前入耳中過耳後。胃脈上耳前筋結耳前。小腸膀胱脈俱結耳後完骨。胃之支脈亦過耳後。又素問心腎肺脾胃五絡皆屬之于耳中。又謂肝病氣逆則耳聾。

耳聾聲有所蔽塞則不通。在外之蔽塞與在內之蔽塞一也。內氣本流通。何以蔽塞。則風火痰血之爲之也。在上爲心肺之氣。在下爲肝腎之氣。在中爲脾胃之氣。氣動而爲火。火動而爲風。壅于上焦。擾攘不清。則外入之聲爲其所亂。若更精液而痰凝。傷陰而血瘀。則耳竅蔽塞。甚則爲痛爲腫結核停膿。不但聾也。不甚則爲鳴。氣上出于耳而作响也。氣上盛則鳴甚。不盛則鳴。

不甚。上焦氣壅屬實。下焦氣逆屬虛。或陰虛而火上炎。或陽虛而火上浮也。中焦多屬濕熱。酒食之所鬱積也。各藏府經脈皆能動氣。生火作熱。豈必拘定脈絡通耳者乃然哉。此皆言內氣上壅者。若氣虛下陷。則亦鬱。以清氣自下。濁氣自上。清不升則濁不降也。更有老年精銳氣衰。不能上通者。卽無濁火上亂而精氣萎弱。既不上通。則竅遂漸閉。如路久不行而茅塞也。亦有沉靜之人。收視返聽。精氣退藏于密。而上竅亦漸閉者。乃高壽之徵也。明此義而紛紛之說皆一以貫之矣。耳聾治法。熱者犀角飲子。大便秘者加大黃。壅熱生風。犀角散。兼外風者防風通聖散。見中風兼痰者滾痰丸。見痰鬱火防風通聖散加大黃酒

煨。再用酒炒三次。又同各味通用酒炒加味逍遙散。見厥氣上

逆者。多見眩暈之証。沉香降氣湯。蘇子降氣湯。甚者吞養正丹。

並見以鎮墜之。腎水虛精脫者必顫顫黑。六味地黃丸。見虛

本事地黃湯。內有羌防二味為腎虛而兼受風邪也。無風邪者去之。腎虛寒者八味丸。見虛

損益腎散。多恐為肝虛。四物湯。見血加防風柴胡葛蒲茯神。勞

役傷房勞傷。虛火上炎。瘦悴昏瞶。是為勞聾。益氣聰明湯。耳

者宗脈之所附。脈虛而外風襲。使經氣閉塞。是為風聾。多見頭

痛。排風湯。見中風桂星散。磁石丸。氣壅頭目不清。清神散。氣

閉不通。通氣散。外治通神散。通耳法。追風散。甘遂半寸。綿

裹插耳中。口嚼甘草。蒼木長七分。一頭削尖插耳內。一頭平

安艾灸覺耳中有熱氣效。人聾耳麻耳丸勝金透關散。

耳鳴經謂上氣不足。又謂腦髓不足。則腦轉耳鳴。皆精氣虛弱

之故也。王汝言謂耳鳴甚者。多是痰火上升。又感惱怒而得。若

腎虛而鳴者。其鳴不甚。當見勞怯等証。薛立齋云。若血虛有火。

四物湯見加山梔柴胡。氣虛補中益氣湯見血氣俱虛八珍見

頂加柴胡。若怒而鳴。氣實小柴胡見寒加芩歸山梔。虛用八珍

加山梔。若午前甚者。陽氣實熱也。小柴胡加黃連山梔。陽氣虛

補中益氣見加柴胡山梔。午後甚者。陰血虛也。四物見加白朮

茯苓。若腎虛火動。悶然脛痠。或痰盛作渴。必用地黃丸見虛

甚者當鎮墜正元飲。見眩暈黑錫丹。見呃逆有熱者龍齒散。腎

者宗脈所聚。聚于耳。宗脈虛。風邪乘虛隨脈入耳。氣與之搏。而

鳴。先用生料五苓散。見傷加製枳壳橘紅紫蘇生龜同煎。吞青

木香丸。見散邪疎風下氣。續以芎歸飲和養之。若更四支抽掣

痛。睡着加打戰鼓。耳內覺有風吹奇痒。黃蘗丸甚效。黃蘗丸甚效。黃蘗丸甚效。黃蘗丸甚效。

耳腫痛生瘡。鼠粘子湯。柴胡清肝飲。耳濕腫痛涼膈散。見發熱

加酒炒大黃黃芩。酒浸。防風荆芥羌活。濕多外用枯礬吹入耳

中。耳濕結塊生瘡。脂地龍糞金下墨。研末葱汁和搗如棗核。綿

裹塞耳。潤則換。耳乾痛亦用此方。耳痛如蟲內走。蛇蛻吹入立

愈。

時耳勞傷氣血。熱氣乘虛入聚。則生膿汁也。內服柴胡聰耳湯。

蘇荆子散外用紅綿散壯人積熱者玉屑無憂散送解毒雄黃

丸

並見

下三四次效。出膿髮灰吹之。耳膿潰爛。礬灰鉛丹吹。又

方。陳皮燒灰一錢。輕粉三分。麝五厘。吹入卽乾。耳出血。龍骨

末吹卽止。按初起忌歛瀉。鉛丹礬不宜用。紅棉散亦勿用也。

耳痒沈存中病赤目。百治不瘥。邱華問耳中痒否。痒是腎風。四

生散

見中風

二三服卽瘥。如言服一次目反大痛。更二服遂愈。以

語孫和甫。孫曰。嘗見呂吉甫目久病。服透冰丹乃瘥。透冰丹亦

療腎風也。聖惠云。有耳痒直挑剔出血乃止者。此腎浮虛毒上

攻也。宜透冰丹。戒酒麪鷄猪之屬一月。若不能戒者無效也。

蟲入耳生羌擦猫鼻卽尿。取滴耳蟲卽出。或用管入耳。極力吸

之。蟻蚋蚣入耳。生薑汁或蒜汁灌。或炙猪肉雞肉置耳邊。
蒼蠅入耳。皂角子蟲研爛。生蠔血調灌耳中。蚤虱入耳。菖蒲
末炒乘熱棉裹着耳邊。一蜣螂入耳。鹽擦耳內。或朋砂胆礬等
分爲末。吹卽化水。水入耳。薄荷汁點立效。耳中有物不能
出。弓弦頭散處傳好膠入耳中點之。徐徐引出立效。百蟲入
耳。用茶油一滴。滲入耳內。卽效而安。